庫全書

子部

欽定四庫全書

詳校官太醫院吏目正宋 桂

編修臣倉聖脈覆勘

神農本草經疏卷二

子部

校對官中書臣吳 謄録監生臣汪承泰

總校官進士臣祭

琪

俊

江浦	大多 黄耆 ボボ		四项卷二	欽庭四庫全書
	人胞	1 !	缪希维 撰	

金りした 大熱 狗陰並 雀肉 鳥頭 附子 巴戟天 淫羊藿 へ胞 たこれ 硫黄 肉桂 天雄 嶷絲子 肉從答 紅鉛 人參 海狗腎 街耆 蛇床子 仙茅 白膠 銷蘆芭 補骨脂 當歸 陽起石 羊肉 鹿茸 ニボ

破氣 降氣 欠定日夏人一日 閉氣 青皮 黄耆 降真香 銀杏 厚朴 牽牛 米麪食 枳實 蘇子 神農本草經疏 猪脂油 枳殼 鬱金 檳榔 枇杷葉 ニボ

金りにた 破 提發散 乾漆 桃泉 没樂 桃 血 橘 水蛭 仁 紅 た : 穿山甲 甀蟲 薑黄 五靈脂 紅花 沈香 长二 蘇方木 騏驎竭 盛蟲 花蓝石 烏藥 三稜 肉桂 蓬茂 延胡索 乳香

щ	神農本草經疏	神	大足日事人方
防風	獨活	羌活	細辛
麻黄	桂枝	轧笛	吳茱萸
		散	辛温辛熱發散
			薄荷
葱 白	豪 本	前胡	荆芥
細辛	生苗	白芷	防風
獨活	羌活	乾葛	麻黄
紫蘇	川芎	柴胡	升麻

金ラレブ 吐 豪本 玄明粉 藜蘆 鹽湯 瓜帶 大黄 芒硝 常山 枳實 梔子 川芎 卷二 白芷 厚朴 巴豆 豉 人參蘆 葱白 皂炭 牽牛 鰕汁

た 續時子	琥珀	商陸	車前子	猪苓	利水	山梔	降泄
漢防巴	芜花	茯苓	亭 蔗	澤鴻		知母	
神農本草經統一	甘遂	扁蓄	滑石	木通		天門冬、	
(S)	大戟	鳥桕根皮	海金沙	瞿麥		玄参	

損津液 金少じたべつ 固澀 飲 龍骨 郁李仁 益智子 白芍藥 白梅 攝 山茱萸 壮蜩 酸棗仁 五味子 白礬 表二 礬紅 桑螵蛸 粟殼 酷 蛇床子 訶黎勒 半夏 鳥梅

欠足日華全書	開竅	橘紅	枳實	三稜	山查	消導	原蠶蛾	肉果
神農		砂仁	緑礬	蓬茂	麥芽			連頻
神農本草經疏			萊菔子	神麴	草果			阿芙蓉
£			紅麴		檳榔			金櫻子

辛燥	烏樂	豆蔻	沈香	香燥	安息香	龍腦香	金りしんノー
	木香	藿香	麝香			射香	**************************************
		香附	龍腦香			蘇合香	
		丁香	縮砂蜜			檀香	
		爆 鳥藥	烏藥 木香 香附	原藥 木香 電整 藿香 香附	燥 原藥 高藥 本香 養香 養 香 形	吳息香 學 見之	息香 麝香 蘇合香 整香 春門

次定四車至書	滞腻	知母	地黄	濕潤	懷香	乾黄	辛熱	ニボ
阿神農木		猪脂油	當歸		生薑	吳茱萸		
神農本草經疏		麻仁	肉從蓉		巴豆	胡椒		
六		枯樓仁	天門冬		龍脳香	蒜		
-		<u> </u>						


發濕 滑 利 猪羊犬肉 冬葵子 柿 棃 油 酥 腻 憨 榆皮 瓜 茄子 蜜 炙煿 卷二 地黄 青菜 牛乳 李 椿根白皮 蓴菜 南麪 桃

工名 金	鹿茸	補命門相火	盧會	大黄	山梔	苦寒傷胃	殿鱼
白膠	巴戟天			苦參	黄檗	,	南
中農本學酒流	附子			立参	黄芩		
仙茅	人胞			知母	黄連		

The second second

酸寒 鹹寒 金写口戶人 補腎水苦寒 狗陰莖 童便 黄檗 陽起石 白芍藥 芒硝 牛膝 膃 天門冬 **莵絲子** 肭 臍 烏梅 原蠶蛾 玄参 淫羊藿 秋石 補骨脂 知母

3			鹹		甘	i	生
7.n.) 0 of 7.1 to	蛤蜊	食鹽		甘草		菱	生冷
神中		商陸		飴糖		杂	
神农本草經滅	蟶	城水		大聚		茶	
		鹿茸		蜜	٠	李	i



			THE REAL PROPERTY.	7				
בייניוטיייי לייים	檳榔以上	青皮	散	忌破氣	不發熱單惡寒者居多	陽虚即真氣虚其證惡寒或發熱自汗汗多亡陽陽虚	陰陽主	續序例下
		to		降泄	心寒者	米虚其	陰陽表裏虚實門	
神農本草經疏	大黄	枳殼	,	利水	居多	證惡寒	質門	
草經疏	石膏	厚朴		苦寒		或發熱自		
,	•			又忌酸		汗汗多		
扎	山梔	牽牛		辛熱發		亡陽陽虚		
1832	20430	Day Papara		_ XV				<u> </u>

THE SECOND SHIP IS	W UM Process	a richida	http://www.	SELECTION OF SERVICE	The same of the	Commence Commence	mar art imm	-
荆芥以	羌活	烏梅	黄檗	海金沙	漢防已	澤瀉	知母	をといいたとこと
發上 散	獨活	酸以上	玄參	商陸別水上	学庭	木通	天門冬、	K
	前胡	吳茱萸	槐花兴上	黄芩	猪苓	瞿麥	生地黄	
	防風	麻黄	ち藥	黄連	滑石	木桕根皮	括樓以上	

次·· 可 公子自	陰虚	TA.	701	4.	当		宜補
鱼汗自江	印精血由	陽起石	附子	紅鉛	當歸	人參	袖甘
计發	业其地	¥	ፈኒ	祐	白	苦	温
神農本草經	政為放東を	羊肉	仙茅	補骨脂	白膠	黄耆	熱
然骨乏無力	夕痰吐血吹	雀肉	鹿茸	巴戟天	淫羊藿	二术	
盗汗自汗發熱寒熱潮熱骨乏無力不眠氣急腰	陰虚即精血虚其證為放嗽多痰吐血咯血嗽血鼻如		大懷香	桂	人胞	炙甘草	

背痛 金りいたとう 傷胃 忌補氣 硫黃 桂枝 南星 人參 胡椒 并升提發散 復忌破氣 F 黄耆 陽起石 鳥頭 半夏 仙茅 卷二 利水 燥熱辛温 鹿茸 火酒 海狗腎 附子 二术 又忌大寒大苦 官桂 乾薑 丁香 异茱萸 人胞湖 氣上

70/20	A AND DESCRIPTION	Janes Co.				-	
こう地黄	平 鹹寒	宜生精補	川芎	柴胡	玄明粉	黄連	烏藥
柏子仁	孝兼苦寒	宜生精補血兼清虚熱	防風以上	羌活	大苦傷胃以上大寒	大黄	生薑以
早級職人乳		斂攝 酸寒	故散破氣利水樂見前	獨活	麻黄	芒硝	一燥山栀
沙苑茶装		甘寒	外樂見前	豪本	升麻		黄芩
黎	1	甘		<u> </u>	<u> </u>	<u></u>	

金は、ローハイント 表虚其證自汗惡風洒淅寒熱喜就溫煖脈浮無力 忌破氣 青筒 枸杞子 牡丹皮 溺白重 沙參 山茱萸 升發 鼈甲 續斷 石斛 酸棗仁 辛熱 卷二 黄檗 麋角膠 地骨皮 麥門冬 白芍樂 薯蕷 車前子 知母 五味子 阿膠

桂枝有熟者五味子	人參	宜補斂 益氣	乾薑以上破氣樂見前	荆芥以上	紫蘇	羌活	麻黄
五味子	黄耆	盆氣實表 甘	氣樂見前	吳茱萸	薄荷	獨活	升麻
	白芍藥	酸		桂枝寒者不	白芷	前胡	防風
+ =	甘草			不尽中	生酱	乾葛	柴胡

宜溫補 甘	氣藥見前	知母	奉牛以上	大黄	忌破氣 下	或傷寒下後痞滿	裏虚其證洞泄或完設不化心腹痛按之即止或腹脈
佐以辛熱		黄檗	黄芩	芒硝	苦寒	滿	或完穀不化
		天門冬	黄連	巴豆			心腹痛按之
		若以上破	山梔	玄明粉			即止或腹脹

欠三可車人方 两柱	醋城处上	ち樂	黄者	忌補斂 下	陽實即表邪熱盛其證頭痛寒熱遍身骨痛無汗	糯米	人參
神農本草經疏	附子	五味子	人参	大熱	盛其證頭痛	肉桂	炙甘草
吳茱萸	胡椒	米麪食	二术		寒熱遍身母	附子有熱者乾薑	术
吴茱萸以上下藥見前	乾薑	猪羊犬肉	桂枝		肩無汗	者乾薑	大棗

金りてんと 陰實即裏實外感證屬邪熱內結者其證胸腹鞕痛手 不可近大便七八日不行或挟熱下痢 宜辛寒發散 忌辛温發散 石膏 荆芥 薄荷 前胡 升麻 柴胡 羌活 補斂 知母 天寒暑加辛熱辛溫佐之 葛根 防風 黄芩 麻黄春夏思之 麥門冬 紫蘇 葱白

B. こう ま 本	山栀 黄芩 黄連 蓝	宜下 苦寒 鹹寒 甘辛	諸樂俱見前
-----------	------------	-------------	-------

Committee of the second second

金けでルイニー 宜下 街連 童便 大黄 諸樂俱見前 如挾虚有痰者宜麥門冬竹瀝蘆根汁黎汁牛 赤芍欒生地黄牛膝牡丹皮桃仁甚者大便結嬠 如婦人熟入血室因而厭者藥中以童便為君加 清熱 甘寒 芒硝 山栀 苦寒 知母 石膏 鹹寒 童便 黄芩

陰 厥即寒厥其證四肢厥逆身冷面青踡即手指爪青 欠こり 戸れます 黯腹痛大便溏或完穀不化小便自利不渴不省人事 忌下 宜補氣 芍樂 食鹽 加芒硝大黄下之通即止勿盡劑 破氣 温中 岩寒 乾薑 醋酸寒下破氣苦寒諸樂俱見前 太陰玄精石 甘溫 神農本草經疏 鹹寒 辛執 附子 酸寒 童便以上 五五 桂

金りで屋と言 上盛下虚屬陽盛陰虚 宜降 忌升散 蘇子 生地 諸樂俱見陰虚條下 异茱萸 五味子 盆陰 下 甘寒 枇杷葉 沙參 牛膝 助陽補氣 卷二 酸寒 童便 麥門久 復忌破氣 白芍藥 佐以鹹寒 苦寒 玄參 山茱萸 枸杞子 燥熟辛

20.10 HOL 2.1.	石斛	生地黄	宜補血	諸樂俱見前	尼升發	心虚八盏	五臟六	黄檗
130	酸聚仁	中 龍眼肉	甘温 酸斂	供見前	破氣 苦寒		五臟六腑虚實門	天門冬
神農本草經疏	五味子	人多	双 佐以鹹寒		《 辛燥 大熟			
+ 77	柏子仁	炙甘草	鎮墜		熟			

Charles Printing Co. Management of the control to the control

龍齒	犀角	宜降 清熱	諸藥俱見前	忌升 破氣	驚邪屬心氣虚	炒鹽	丹參
金箔	丹砂	豁痰	削			丹砂	茯神
牛黄	琥珀	平經日舊者平之					遠志
代赭石	真珠	下之					鹿茸

ラスス・コラ ラ 人・よう 癲癇屬心氣虚有熱 宜降 忌補斂 膽星 遠志 諸樂見驚邪條加 諸樂俱見前 羚羊角 清熱 升 7 麝香 豁痰 鬼臼 麥門冬 神農本草經疏 竹瀝 月母 石斛 丹參 桔梗 ナメ 天竺黄

心煩屬心家有熱 忌升 宜清熱 得眠中諸樂 竹茹 玄參 生地黄 諸樂俱見前 破氣 燥熱 生津液 木通 茯神 麥門冬 甘寒 申受本學與節 遠志 甘平 生甘草 辰砂六一散 辛酸 糸用不 黄連

金定四庫全 ~ 怔忡屬心血不足 心澹澹動 忌宜俱同心虚 忌宜俱同心虚 酸棗仁 竹葉 丹參 沙参 龍眼肉 茯神 麥門久 遠志 生地黄 生甘草 玄參 知母 石斛

ここう。	黄芩 黄檗 黃連 牡蠣	黄者 五味子 白芍藥 酸棗仁	生地黄 當歸 茯神 龍眼肉	鹹寒	宜補斂 清虚熱 甘酸 甘平 甘寒 苦寒	諸樂俱見前	忌破氣 辛散 爆熱	盗汗屬心血虚汗者心之液也	
------	-------------	----------------	---------------	----	---------------------	-------	-----------	--------------	--

Trace and

尚歸	鬱金	宜活血	汗下諸	虚蟲	三稜	忌破血 こ	伏梁屬心經	金人也一個人一日
延胡索	五靈脂	凉血 散熱通	汗下諸樂俱見前	紅藍花	蓬茂	汗下	伏梁屬心經氣血虚以致邪留不去	卷二
赤芍藥	乳香	散熱通結 辛鹹		水蛭	盖山街		留不去	
遠志	没藥			桃仁破血	亡蛀虫蛀			

世人 根 根 一		
丁 陳	甘菊	昌浦
· 散 散	甘草	次 神
中	胡麻	壮 蠣
穀地黄	穀精草	祭用東垣

:

金定匹庫全書 胸脇痛屬肝血虚肝氣實因而上逆 忌斂 宜降氣 養血 蘇子 沈水香 決明子 諸樂俱見前 者加 補氣 破血 鬱金 細辛 刺蒺藜 川芎 和肝 辛甘 香附 番降香 木香 羊牛兔肝 平緩 縮砂蜜 因鬱而虚 川通草

木瓜	宜酸辛廿	羊肉	二术	忌下 復忌升	轉筋屬血虚	白芍藥	當歸
牛膝 上	甘平	野川東幹	黄耆	燥熱		續斷	生地黄
當歸身		麪明氣餘忌藥俱見前	銀杏	閉氣 苦寒		鹿角膠	橘皮
白芍藥			猪脂	破氣			甘草

金定四庫全書 日光短屬肝血虚及腎水真陰不足 宜補肝兼滋腎 甘溫盆血 忌破氣 升 縮砂蜜 甘枸杞 諸樂俱見前 石斛 穀精草 燥熱 五味子 續斷 生地黄 決明子 甘菊花 炙甘草 甘寒除熱 陳皮 天門久、

次いうラーハラ 目翳屬肝熱兼腎水不足 目昏屬肝血虚有熟兼腎水真陰不足 宜補肝血 宜同目光短加黄檗 忌破氣 升 忌同前目光短 諸樂俱見前 麥門冬 1 除執 燥熱 苦寒 神農本草經疏 退翳 羚羊角

大手下下方人言 亡血過多角弓反張屬肝血虚有熱 甘菊花 貝子 犀角 珊瑚 伏弱雄 沙苑族藜 人爪 生地黄 空青 真珠 木賊 女貞實 蟬蜺 琥珀 決明子 瑪瑙 黄連 穀精草 石決明 蜜蒙花 天龍 馬目毒公 石蟹 羚羊角

	少腹連陰作痛按之則止屬足厥陰經血虚	五味子 酸東仁	童便 有汗加人參 黃耆	牛膝 麥門冬 牡丹皮 甘菊花	當歸 生地黄 白芍藥 炙甘草	宜補血清熱 甘寒 甘溫 酸寒 鹹寒 辛潤	諸藥俱見前	忌風燥 升 破氣 下
--	-------------------	---------	-------------	----------------	----------------	----------------------	-------	------------

the state of the s

金以巴尼公言 偏頭痛屬血虚肝家有熱不急治久之必損目 忌升 宜同角弓反張加白膠 忌同角弓反張 宜養血清虚熱 當歸 諸樂俱見前 生地黄 燥熱 苦寒 天門久、 甘寒 酸寒 烏梅 甘菊花 辛寒 炙甘草 白芍藥

1. C. 10 ... V. 1. 1. 目黑暗眩暈屬血虚兼腎水真陰不足 宜養血補肝 忌破氣 生地黄 諸樂俱見前 雨前茶 可加黄芩酒炒 工茯苓 燥熱 辛温 清熱 枸杞子 金銀藤 石膏 神農本草經疏 甘寒 甘菊花 黑豆 大黄酒蒸 甘平 酸寒 當歸 芎藭 英四 有實火者

金岁正是人 肥氣屬氣血两虚肝氣不和逆氣與瘀血相併而成 忌破氣 宜和肝散結氣 肉桂 著預 川芎 諸樂俱見前 山茱萸 下 當歸 苦寒 橘皮 五味子 白芍薬 兼行氣血凝滞 沈香 紅花 天門冬 甘温 乾薑 鬱金 黄檗 甘草 甘平

Am	<u>∓</u>	神農本草經疏		Control of the second
	白編豆	白茯苓	蓮肉	炙甘草
P447 1 *	著預	黄耆	大東	人參
		酸平	佐以辛香	宜甘溫 佐
			前	諸樂俱見前
		苦寒	破氣 苦寒	忌下 降泄
				脾虚十二證
	黎用東垣肥氣九治之	祭用東垣	砂仁	紅麴
	赤芍藥	山查	香附	延胡索

4.0. W. Martin, 17.

	干女		神農本草經版	神農		5	ייי ויין שוישב איי יש	7
						食	傷食必惡食	
	肉豆蔻	麥糵	來	粱	同脾虚加穀蘖	虚	同脾	
		+	甘辛	甘溫	香	江原	宜监真源香	ECTION COLIE
L!	別	綠礬川其餘忌樂俱見前	其餘	球 数	1.42	12	三稜	
	逢茂	檳榔	棺	枳實	40	*	草果	1
		消導起伐 苦寒 復忌燥	苦寒	尅伐	消導		尼破氣	
				氣虚	屬脾	化	飲食不消化屬脾氣虚	A.
<u></u> '	酸東仁	白芍藥	白	橘紅	坏	久	麥門冬	

A CONTRACTOR OF THE SAME OF TH

金万口匠人 忌潤濕 宜健脾消導 當歸 橘皮 茄子 白芍薬 苦寒諸樂見前 地黄 苦寒 薯蕷 甘溫 酒 知母 肉從蓉 白茯苓 辛香 蓮肉 草果 糟 玄參 瑣陽 野食 湖温 猪脂 山查 白藊豆 天門冬

2/0.10: 1.2.11 停飲為恣飲湯水或冷茶冷酒所致 忌下 菔子 麥芽 傷肉食輕者宜蒜山查兼黃連重者宜礬紅東肉 為九服二錢不可過終身忌蕎麥傷麪食宜炒菜 氣虚人不可下宜加參术 如腹痛大便不通宜下之枳實檳榔厚朴大黄元 酸斂 濕潤 草豆蔻 神農本草經疏 滞膩 縮砂蜜 穀糱

金江区屋人 水腫屬脾氣虚 宜健脾利水 忌破氣 橘皮 桑白皮 人參 郁李仁 諸藥俱見前加忌栝樓根及仁 下泄 澤寫 白术 淡渗 旋覆花 濕潤 卷二 兼辛散 鹹 紫蘇 猪苓 半夏 苦 寒 木通 茯苓 桃仁 白豆蔻

-	A SECTION A	United At a	ACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSO		TVEST COL		CIGHT SA	Ded Market
CALLO UPL ZIAIO W/	縮砂蜜	猪苓	赤小豆	木瓜	人參	淡滲	宜補牌益氣	食鹽
*	,	\m	٠.	44				2
神農	通草	澤瀉	香薷	意苡仁	二术		燥濕	商陸越上餘忌樂俱見前
神農本草經疏				1-			利水	上
經疏		盐	ė	孟	呂		水	餘
		薑皮	烏蠡魚	桑白皮	橘皮		辛香	忘遊
		/**	萬	皮			香	頂
7		à	4-	46	۸٤.		甘温	見前
主 公		烏芋	車前子	茯苓	著預		温	
		ナ	門子	7	預		佐以	
							い	

金以正屋人三百 脾虚中滿屬脾氣虚兼脾陰虚 書劇夜靜屬脾氣虚宜補氣健脾 忌破氣 佐以辛香 飴糖 茯苓 餘忌藥俱見前 人參 大東 車前子 消導 利水 二术 卷二 橘紅 蜜 白芍薬 甘 甘溫 薑皮 甘草以上 桑白皮 淡渗

欠いり車とう 噎膈屬氣血兩虚由於血液衰少而非痰氣壅逆 平 夜劇畫靜屬脾陰虚宜補脾陰 茯苓 蓮肉 藿香 五味子 酸聚仁 酸寒 淡渗 橘皮 木瓜 白芍禁 縮砂蜜 神農本草經疏 桑白皮 石斛 山樂 無熱證者佐以桂 兼制肝清熱 九 蘇子 車前子 白藊豆 甘

くこじく しゃん 宜降 以順氣 忌破氣 蘇子 牛乳 蘆根汁 諸樂俱見前 白芍薬 1.1.1.1 清熱潤燥 升 畫汁 酸東仁 橘紅 復忌下 卷二 甘温甘平以益血 消導 梨汁 龍眼肉 枇杷葉 白豆蔻仁 The state of the s 燥 苦寒 非汁 人乳 人參 畧佐辛香

大江 新砂蜜	白芍藥	蓮肉	人參	宜溫中補氣	諸樂俱見前	忌破氣 下	脾泄屬氣虚
橘皮	升麻	白稿豆	术	升清	คัว	消導	
神農本草經疏士):L		夕	甘溫		苦寒	
木香	柴胡	茯苓	炙甘草	甘平			
丁香	肉豆蔻	車前子	著預	佐以辛香			

金りとうんとする 健忘屬氣血兩虚 通竅 忌升 宜益胖陰兼補氣 藿香 酸聚仁 粪色白者須服九製松脂 諸樂俱見前 燥熱 復思苦寒 辛散 白芍薬 白萊菔 卷二 酸斂 甘温 五味子 **兼有濕及痰經年不** 甘寒 人参 辛平以

尺已日号 人士	人參	宜補氣	諸樂	忌破氣	倦怠嗜卧屬脾氣不足	石菖蒲	麥門冬	炙甘草
神農本草經疏	白术	兼健脾 甘溫	諸樂俱見前	消導 苦寒	屬脾氣不足	浦 遠志	· 丹參	平黄耆
草網旒	苦者	血 辛香					茯苓	龍眼肉
*	茯苓						茯神	柏子仁

金少正尼台言 脾虚腹痛按之則止屬血虚 宜益氣補血 忌破氣 酸聚仁 薯賴 縮砂蜜 諸藥俱見前 人參 破血 橘皮 石斛 炙甘草 甘温 炙甘草 香燥 苦寒 酸平 龍眼肉 藿香 穀檗 麥門冬 大東 白芍藥 白豆蔻 白藊豆

次三回車へ·ラ **痞氣屬脾氣虚及氣鬱所致** 忌破氣 下 宜健脾 兼散結滯 藿香 痞氣九治之 紅麴 諸藥俱見前 人多 香附 濕潤 吳朱英 白芍薬 神農本草經疏 苦寒 甘溫 穀糱 木香 橘紅 辛香 麥糵 Ī 縮砂蜜 祭用東垣

肺虚七盤 くこりくしん こう 宜清熱 忌補氣 蜜 貝母 天門久 桑白皮 諸樂俱見前 升散 降氣 棃 五味子 沙参 麥門久 辛燥 酸斂 卷二 潤燥 温熱 蘇子 柿 杏仁 百部 五倍子 百合 無熱者加 枇杷葉

CACO Con Aution	括樓根	蘇子	宜降氣	前	訶子	忌破氣 升	勒喘屬肺点	人參
神農本草經疏	竹瀝	枇杷葉	消痰 辛涼 甘寒 苦平		亞美蓉	發散	齁喘屬肺虚有熱因而痰壅	
子經藏	天門冬、	月母	甘寒 苦平		粟殼以上餘忌藥俱見	收澀	生	
11411	麥門冬	桑根白皮			际忌藥俱見			

金万里尼人 **欬啾吐血痰屬肺熱甚** 忌升 收澀 宜降氣清熱 射干 款文化 百部 諸樂俱見前 破氣 復忌補氣 潤肺生津液 百合 卷二 前胡 海荷 破血 凉血養血 辛燥 馬兜鈴 白前 甘寒 温熱

11.100.000.000	THE REAL STREET	Total Marie Control					A STATE OF THE STA
に宜俱同放戦	咽喉燥痛屬水涸火炎肺熱之極此證法所難治	尼宜俱同欬嗽	聲啞屬肺熱甚	童便	茅根	鬱金	甘平 鹹寒
秋 中 東本草經路	涸火炎肺熱	嗽	J	知母	剪草	生地黄	佐以苦寒
經底	之極此證法			餘藥肺虚條內然用	白发	浦黄	
- - + 20	所難治			條內然用	阿膠	側柏葉	

金好也是人 息責屬肺氣虚痰熱壅結所致 龜胸屬肺熱有痰 肺痿屬肺氣虚有熱 忌破氣 忌宜俱同齁喘效嗽 忌宜俱同肺虚 宜降氣 諸樂俱見前 辛熱 清熱開痰 補斂 佐以散結

俱見前	補骨脂	仙茅	忌升 破氣	腎虚即腎水真陰不足十八證	息賁丸治之	桔梗	橘皮
· 神農本草經藏	鹿茸	芭戟天	利水 温熱	医不足十八十	2	旋覆花	白豆蔻
滋	人胞以上	胡蘆	辛燥	登		桑白皮	白芥子
<u>干五</u>	人胞以上補命餘忌藥	人參	補命門相火			参用東垣	射干

the control of the party of the

整甲 中前子 中前子 中前子 中間子 中間子 中間子 中間子 中間子 中間子 中間子 中間
--

人にしのう たから 骨蒸潮熱屬精血虚極以致陽無所附火空上炎 骨乏無力屬陰精不足腎主骨故也 腎虚腰痛屬精氣虚 忌宜俱同腎虚 忌宜俱同腎虚 宜同腎虚 忌破氣 燥熱 諸藥俱見前 神農本草經疏 彭

金りしたと言 傳尸勞 五心煩熱屬真陰不足 宜除熱益陰 忌同腎虚 神水 諸樂同腎虚加 胡黄連 盧會 安息香 卷二 兼清鎮 象膽 鬼臼 丹砂 獺肝 乾漆 磁石

欠記るるこれか 夢遺泄精屬腎虚有火 宜滋陰 忌同腎虚 忌宜俱同腎虚 蓮花蕋 龍骨 牡蠣 餘藥同腎虛條 生精補血 遠志 覆盆子 生甘草 神農本草經疏 除執 **逃子** 魚膠 石斛 酸斂 佐以澀精 縮砂蜜 圭 蓮肉 桑螵蛸

溺血血淋屬腎虚有火熱傷血分 シリノレア とう 溺有餘瀝屬氣虚 宜同腎虚以五味子黄檗人參為君如菜絲子曆 便短澀熱赤頻數屬腎虚有火 忌宜俱同腎虚 者忌人參用沙參 子為臣益智為佐如覺平日肺家有熱或放喉有心 忌同腎虚

いたいりゅうという 傷精白濁屬房勞過度以致精傷流出似白濁證 五淋屬腎虚兼有濕熱 宜同腎虚 忌同腎虚 忌利小便 宜同腎虚加側柏葉 韭白 諸樂俱見前 燥 乾地黄 神農本草經疏 戎鹽 阿膠 浦黄 茅根 きか

精塞水竅不通屬房慾不竟或思慾不遂或懼泄忍精 金少里尼人 或老人氣不足以送精出竅 宜同腎虚加清濕熱 忌破氣 下 忌同腎虚 鋽解 茯苓 諸樂俱見前 黄檗 薏苡仁 利小便 燥熟 車前子 石斛

宜行敗精 壯實人宜無泄火 老人宜無補氣血 宣行敗精 壯實人宜無泄火 老人宜無補氣血 高音 京
--

善恐屬腎氣虚腎藏志故也 くらならん 宜清熱 忌同腎虚 消屬腎陰虚火伏下焦 青蒿側柏葉為佐 諸樂同腎虚宜以黄檗五味子生地黄天麥門冬 人參為君石斛牛膝知母人乳童便為臣地骨皮 膝沙苑蒺藜鹿茸天門冬為臣龍骨牡蠣各 1:1:1:1 及峻補真氣 潤 酸斂

是證 とこううという 陰竅漏氣屬腎氣虚不固腎主約氣虚則不能納故見 忌破氣 宜補氣强志 忌破氣 酸隶仁 諸樂俱見前 人参 降 苦寒 辛平 香燥 遠志 柏子仁 神農本草經疏 甘温 石斛 茯苓 佐以辛香 鹿茸 沈水香 四十

金罗世尼人言 宜補真氣 龍骨 橘皮 蘇子 覆盆子 香附母燥餘忌藥俱見前 **祭用腎虚條內諸藥** 人參 酸斂 枸杞子 五味子 通草似上 白豆葱 牡蠣 固澀 卷二 降香 金櫻子 益智子 山茱萸 蓮鬚 遠志 木香 沈水香

尺の日うことか 寒熱先後二途 疝屬腎虚寒濕邪 東虚客之所致丹溪謂與腎 相干者誤也又有先因濕邪為病後成濕熱者 忌升 此兼宜除熱 宜補氣 諸樂俱見前 破氣 通野氣 黄耆 神農本草經硫 除濕 濕潤 橘核 又有陰虚有熱之人 型 合数ス

忌同疝 兼忌婦	奔豚屬腎虚脾家濕邪下傅客腎所致	术	虚熱而痛加黄檗	仙茅	虚寒而痛加桂	杜仲	が枝核
0燥	濕邪下傅客腎		黄檗 車前子		姓 懷香	萆薢 巴戟天	川楝子 牛膝
	所致		則子 濕盛者加		香 補骨脂	蚁天	

こしゃ ししこ と しこれで 門虚即元陽真火不足四證 忌下泄 破氣 宜補氣 補腎水岩寒藥 奔豚丸治之 諸樂俱見前 著預 懷香 發散 辛寒 苦寒 淡滲 神農本草經疏 散結 蛇床子 桂 山茱萸 燥

	والمرابطة المحاطية	ALLE STREET	مين ميدان (د) د ينطف	All The I die	- Alekania			•
陰接屬命門火衰下焦虚寒	附子	覆盆子	白膠	人參	宜益真陽之氣	苦寒樂公補腎水	黄檗	金好以屋子三言
火衰下焦虚	補骨脂	五味子	肉從蓉	紅鉛	之氣 甘溫	苦寒樂餘樂俱見前補腎水餘樂俱見前	知母	卷二
大	仙茅	巴戟天	菜絲子	人胞	鹹温 甘熱		生地黄	
	陽起石	山茱萸	枸杞子	鹿茸	酸斂		天門冬以	

腎泄即五更及黎明泄瀉者是也亦名大痕泄屬命 くこうう とこう 真火不足 忌同命門虛 忌宜俱同陰痿 宜同命門虚加海狗腎 忌同命門虚 狗陰莖 ¥ 雀卵 火衰陽氣不足 神農本草經疏 蛇床子 白馬隆蓝

畏寒足冷 金ケロたんか 小腸虚一證 宜益氣 甘溫 忌宜俱同命門虚 忌破氣 五味子 砂仁 著預 補骨脂 酸斂 蓮肉 木香 肉豆蔻

尺でしるう ふきす 遺尿屬小肠氣虚兼腎氣虚 宜同小腸虛兼固澀 忌同小腸虚 宜補氣 牡蠣 山茱萸 諸樂俱見前 甘溫 黄耆 益智子 酸温 神農本草經疏 龍骨 麥門冬 智 五味子 金櫻子

古号樂 酸聚仁 竹葉 竹茹 大賊草 甘草 竹葉 沒精草 決明子 人多 當歸 穀精草 決明子 人多 當歸 沒精草 決明子	山栀 瓜蒂 藜蘆 鹽湯	・ 忌汗 吐 下 苦寒 破氣 燥・ 塩塩に産業・ 塩は産業・ 塩は産業
---	-------------	--

經	に可見ないす 三神農木	病後不得眠屬膽虚	當歸 白芍藥	人多酸果仁	宜補膽氣 甘溫 辛溫	諸樂俱見前	忌破氣 升發 燥熱	易驚屬膽氣虚
竹如竹葉	神農本草經藏		竹茹 橘皮	甘草竹葉	温 酸平			

PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

胃虚七證 金りで屋と言 宜益氣 甘平 忌下 石斛 縮砂蜜 諸樂俱見前 人參 白芍樂 破氣 P 苦寒 橘皮 白术 兼寒加生薑 兼熱加竹站 甘淡 卷二 燥熱 酸 白編豆 白茯苓 枇杷葉 木瓜 道内 白豆蔻

霍亂轉筋屬胃虚猝中邪惡氣及毒氣兼有停滞所 胃虚嘔吐宜分寒熱 胃弱不納食及不思飲食 Cのり 南へいう 血虚不同轉筋與肝經 宜同胃虚仍分寒熱治 忌同胃虚 忌宜俱同胃虚 麥門冬、 蘆根汁 神農本草經疏 蔗漿 型六

金はでたべい 宜調氣和中 忌閉氣 滯膩 香薷 滑石 食鹽 白梅 由於暑必口渴或口乾齒燥口苦小水短赤 諸樂俱見前 辛散 木瓜 泥漿 石膏 白編豆井葉 收斂 消導 温補 縮砂蜜 甘草 石斛 大熟 童弱 絲瓜葉 厚朴 橘皮

間上不得吐下不得寫以致腸胃絞痛異常胸腹驟脹 两許恣飲得吐寫即止委中穴在两膝下灣横紋中間 鎞針刺委中擠出熱血可立蘇次用新汲涼水投入鹽 遍體紫黑頭頂心必有紅髮急尋出拔去之急以三稜 紋腸痧屬胃氣虚碎中天地邪惡穢污之氣鬱於胸腹 者加吳茱萸肉桂外治用杉木楠材煎湯浸洗 縮砂蜜 由於寒則小水清白不渴不熱 丁香 橘皮 藿香 其

たいうられたます

神農本草經疏

金りしたた 两筋之中刺入一分 宜通竅辟惡 辛散 忌溫補 龍脳香 入口即死 諸樂俱見前切忌火酒生薑蒜及穀氣米飲熱湯 乳香 冷服 斂 芒硝 蘇合香 卷二 鹹寒 童便 藿香 檀香

Ja. 10	沈水香 白	鬼臼 藿香	乳香蘇	龍脳香 檀香	宜辟惡氣 通畅	諸樂俱見前	忌補 酸斂	中惡腹中污痛屬胃氣虚惡氣客之所致
神農本草經疏	白豆蔻	香	蘇合香	香	通畅胃氣			氣虚亞
子經驗	遠志	橘皮	丹砂	麝香孕婦	辛散			心氣客之所致
면+스	石菖蒲	木香	雄黄	牛黄				

金にていたとう 反胃屬胃氣虚 忌破氣 升 宜補氣 降氣 和胃 乾薑 諸樂俱見前 石斛 人參 岩寒 蘇子 桂 竹站 白茯苓 卷二 甘 清執 橘皮 麥門冬 燥執 白芍樂 酸斂以制肝 蘆根汁 枇杷葉 梅醬

ここうら シー 中酒屬胃弱 宜養胃 忌閉氣 升 白豆蔻 蔗漿 若因虚寒而得者加生薑 諸樂俱見前 酸 辛散 甘温 麥門冬 中農本草里旅 淡渗 燥熱 白編豆 收澀 晃 葛花

金字正屋人工 大腸虚四證 忌破氣 宜補氣 五味子 諸樂俱見前 白芍薬 人参 潤燥 黄耆 梅醬 縮砂蜜 炙甘草 甘溫 橘皮 麥門冬 白茯苓 澤寫 白豆蔻 五味子

てこうらいる 虚寒滑泄不禁屬氣虚 虚熱便閉不通屬血虚津液不足 宜生津液 忌破氣 當歸 生蜜 郁李仁旗津餘忌藥俱見前 五味子 下 潤燥 盧會 燥熱 麥門冬 天門冬、 神農本草經疏 涼血 苦溫 芝麻 炙甘草 盆血 肉從蓉 損津液 五十 麻仁 生地黄

金りひたくこ 腸鳴屬氣虚 The second second 宜補氣 升 忌破氣 忌破氣 升麻 補骨脂 諸樂俱見前 下 E. THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY 甘溫 苦寒 黃耆 濕潤 五味子 炙甘草 苦寒 酸斂 异茱萸 木瓜 白术 肉豆蔻 蓮肉 赤石脂

アランマー・ハー・ラ 神貫本草鉄蔵	柴胡 黄檗	蓮肉 白編豆	人參對者	宜補氣 升提 除濕熱	忌同大腸虚	脫肛屬氣虛兼有濕熱	宜同大腸虚加升麻柴胡以佐之	諸藥俱見前
經藏	防風	升麻	炙甘草	•			以佐之	
李	黄連	乾葛	白术					

the second of th

र्वेद्धा १, १२२ का हुए ११ । असीर श्रम्भ अस्तर अस्तर स्थापन

う 一神農本草經	卡泰 由子二 日	黄檗 山茱萸 天	頻數不能少忍加麥門冬	桑螵蛸 雞胜胚	宜同膀胱虚加牡蠣。	諸藥俱見前	忌降下 濕潤 燥熱	小便不禁屬氣血虚
本本	甘句已子	天門冬 鼈甲	五味子		龍骨鹿茸			

DATE MANY

3 . . C. TE E. A.

以1000年代的1000年代日本的1000年度,1000年度日本的1000年代日本的1000年代日本的1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度,1000年度 金りでたくでし 膀胱氣 遺尿屬本經氣虚見小腸虚係內因膀胱虚亦能致 尿故復列此 三焦虚二證 忌宜俱見小腸虚 忌破氣 降 忌宜俱同疝 諸樂俱見前 復忌升發 苦寒

ころしつ うべかう 男人 腹寒屬中氣虚 短氣少氣屬氣虚 宜補氣益精 忌同三焦虚 忌宜俱同三焦虚 宜補中益氣 沈香 甘温 五味子 黄耆 神農本草經疏 甘寒 白术 酸温 益智子

金りせんとう 心實即實火實熱五證 以緩之 宜降火清熱 忌補斂 升 黄連 牡丹皮 諸樂俱見前 鹹寒以潤之 熱 苦寒以折之 辛寒以散之 黄耆 滑石 犀角 温燥 生甘草 石膏 麥門冬 丹砂 麥門久、 五味字 甘寒

についうあいないう 舌破屬心火 煩躁屬心家邪熱及心火內炎 譫語屬心家邪熱 忌宜俱同心實 忌宜俱同心實 忌宜俱同心實 竹葉 狂亦如之 7 童便 神農本草經疏 躁屬腎 便結燥加芒硝大 五の

金けいたとこと 肝實五證 發狂屬心家有邪熱甚 自笑屬心家有熱邪 忌補氣 尼宜俱同心實 忌宜俱同心實 諸樂俱見前 升 苦寒 酸斂 THE PERSON NAMED IN 甘寒 辛温 酸寒 燥

善怒怒則氣上逆甚則嘔血及飧泄 ここりほんこう 忌補 宜降氣 黄芩 蘇子 橘皮 諸樂俱見前 赤芍薬 升 清熱 Į. 熱燥 青皮 竹葉 鬱金 龍膽草 甘寒 神農本草經疏 閉氣 酸寒 青黛 柴胡 蘇子 番降香 鹹寒 黄連 4 生甘草 生甘草 佐以辛散

金にしたとう 發搐屬肝家邪熱熱則生風風主掉眩故也 脇痛嘔血屬肝氣逆肝火盛肝血虚 善太息忽忽不樂 忌宜俱同善怒 忌宜俱同善怒 青黛 砂仁 橘皮 麥冬、 香附 浦黄 當歸 生地黄 童便 延胡索

	7		and the second	Territoria de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición del composición	TOTAL PROCESSION	CANADAY.	The man
たこの日 肝實養怒	目亦腫痛屬血熱	木通	生甘草	羚羊角	生地黄	宜清熱	尼同善怒
善怒	血熱		·			降氣	٥
神農本草經疏		:	竹葉	童便	白芍藥	利小便	
禮藏		:	甘菊花	蘇子	黄連	緩中	
弄			白茯苓	麥門冬	丹砂		-
in prima pe While mende	mad is warm	n elstyring gar			1. <u>2. 6. 2. 2. 2</u>		La train space

金ラロアノニモ 宜凉血清熱 芒硝 皆青 山梔 大黄 生地黄 刺破眼眶腫處将出熱血立解遲則血貫瞳人目 穀精草 甘寒 木通 竹葉 黄連 蜜蒙花 石膽 赤芍藥 卷二 苦寒 童便 龍膽草 連翹 荆芥 **蕤核急者宜以三稜針** 甘草 酸寒 THE PERSON NAMED IN COLUMN 空青 玄參 黄檗 甘菊 外治銅青

CATO MET YOUR	防風	滑石	术	宜除濕清熱	諸藥俱見前	忌濕潤 收澀	脾實即濕熱邪勝六證	損矣
神農本草經疏	乾苔	車前子	山梔	利小便	前	涎 滞膩	勝六證	
草經疏	黄連	茯苓	猪苓	辛散 風燥		熟鹹甘		
弄さ	枳實	白豆蔻	澤瀉	* 苦寒				

.....

The second secon

宣除濕 清熱 利小便 消積 忌補氣 甘溫 燥熱 慰縣由於脾家濕熱積滯或內傷痰血停積而成	逢术	盡服由於脾 温服由於脾 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之 之	清 見 家温 家温 沙 茯 防		内傷 事前 事前子 章 章	清 高 秦 為 為 為 為 為
	山查 紅麴	木通	防	린	車前子	猪苓
防己 車前子	山查 紅麴	澤寫	茯	苓	学 蔗	白一家無魚
茯苓 葶藶		桑白皮		查	紅麴	三稜

- Aires				SWEETERS.			A THE PERSON NAMED IN	इसान्य द्वान्य असर
Contract to the second	石膏	黄連	酸寒	宜清火除熱	豆蔻	沈香	忌升 辛溫	易饑屬脾家邪火
	竹葉	青黛		生津液	藿香以	麝香	大熱	\
神農本草經疏	麥門冬	連翹		盆脾陰	藿香以上餘思樂俱見前	龍腦	香燥	
<u></u>	石斛	山梔		甘寒 苦寒	任見前	縮砂蜜		·
7427	Maria anno	1 - 21 - 14 - 1115						

連翹 括樓根	烏梅 黃連	麥門冬 生地黄	宜甘寒 酸寒 苦寒	諸樂俱見前	尼溫燥 熱	口唇生瘡	白芍藥 酸聚仁
根乾葛	黄檗	黄甘草	寒辛寒				仁
石膏	支参	白芍藥					

人こうち ときう 濕熱腹痛按之愈甚 口糜 宜服諸樂同口唇生瘡加人參 忌破氣 下 消屬脾家實火 忌宜俱同口唇生瘡 諸藥俱見前 龍膽草 温燥 大青 神農本草經疏 熱 竹葉

	肺實八證	也	防風	黄芩	滑石	宜利小便	諸藥俱見前	思悶氣 酸斂	在五人也是人
•			不愈加孰	升麻	車前子	兼升提 苦寒	花前	温執	整二 卷二
			大黄即土樹	柴胡	木通	寒		燥	
			不愈加熟大黄即土鬱則奪之之義	葛根	黄連				

欠のこりは こんほう 喘急屬肺有實熱及肺氣上逆 宜降氣 忌斂澀 前胡 貝母 蘇子 石膏 諸樂俱見前 補氣 潤 1 甘寒 黄芩 知母 栝樓根 枇杷葉 升 神農本草經疏 岩寒 燥熱 杏仁 車前子 桑白皮 佐以辛散 酸 鹹 桑黄 白前 六十 天門冬、

大のこりにこんかり	百年醃芥菜汁	鼠黏子	栝樓根	桑白皮	辛寒	宜清熱 消	尼同肺實	肺癰屬肺熱極
✓ 神農本草經旅	菜汁	連翹	薏苡仁	桑黄		消痰 降火		132
草經旅		甘草	蕺菜	黄芩		解毒散結		
六十二		敗将草	虎耳草	月母		甘寒		
		草	草	7		苦寒		

次足四事を う 喉癬屬肺熱 一消屬肺家實火及上焦熱 宜同肺實加鼠黏子 忌同肺實 白芨 薏苡仁 麥門冬 天門冬 桔梗 甘草 剪草 百部 神農本草經疏 桑黄 玄參 款久花 貝母 浦黄 キニ 紫苑 射干 百合 白芍薬 生地黄

	甘草	葛根	天門冬	桔梗	蘇子	寒辛寒	宜降氣	忘同肺實	たいいくていた つき
-	五味子	知母	沙参	百部	麥門冬		清熱 補肺	着二	
	白芍薬	玄參	黄連	百合	枇杷葉		生津 甘寒		
	篁竹葉	石膏	栝樓根	黄芩	桑白皮		寒 苦寒 酸		_

麥門冬	黄檗	宜苦寒	諸樂俱見前	忌補氣	命門實二證	腎無實故無寫法	蘆根
牡丹皮 七	知母	甘寒 鹹寒	見前	温熱		寫法	冬瓜
車前子	玄參						人乳
木通	天門冬、						天酒

金定匹尼全世 强陽不倒屬命門火實孤陽無陰所致此證多不治 水竅澀痛屬命門實火 宜同命門實加五味子 忌同命門實 尼同命門實 宜清熱 澤寫 黄檗 利竅 知母 甘寒 卷二 台寒 童便 車前子 鹹寒 生地黄 佐以淡滲 生地黄

-		··						
- Ca 10 101 11410	黄檗	車前子	宜通利	諸樂俱見前	忌斂澀 補	小腸實一證	麥門冬	天門冬
神農本草經疏	知母	白茯苓	淡渗 苦寒 甘寒	見前	補氣		童便	生甘草
早經疏	黄芩	木通	甘寒 鹹寒				茯苓	黄芩
4:+B	黄連	生甘草					木通	牛膝
į.	連	甘草					通	用

鼻淵屬膽移熱於腦 7.7.19 口苦耳聾脇痛往來寒熱 宜清熱 忌辛溫 宜用仲景小柴胡湯隨所見兼證加減 忌同膽實 甘草 諸樂俱見前 補腦 燥熱 橘皮 甘寒 神農本草經疏 甘平 龍膽草 佐以辛寒 六五

金八世屋人 胃實六證 宜下 忌升 寒 辛夷 天門久、 諸樂俱見前 山茱萸 補斂 如邪未結宜清熱發散 苦寒 辛寒 甘菊花 辛溫 黄芩 燥熱 玄參 薄荷 生地黄 濕潤 柴胡 知母 甘

譜語發狂發斑棄衣而走登高而歌屬胃家邪熱實 できり in とこ 黏子玄參栝樓根多用石膏為君便結亦加大黃下 宜同胃實如大便結者加芒硝亟下之發斑者加鼠 忌同胃實 青黛 葛根 大黄 麥久、 竹葉 枳實 神農本草經敬 大青 甘草 知母 六十九 小青 石膏

金定工匠人一 嘈雜屬胃火 口臭數欲飲食屬胃火 宜清熱降火 尼同胃實 忌同口臭 宜同口臭畧兼消導 黄連 石斛 青黛 苦寒 甘寒 蘆根汁 卷二 連翹 竹葉 石膏 麥門冬

菜 与 大 一 横 神	ここうる ここの 中農本学經疏	蘆根 橘皮 通草	宜同胃實加枇杷葉竹如	已心同明實	或乾渴	嘔吐屬胃火者必面赤小便短赤或澀大便多燥口苦	忌宜俱同口臭	口淡屬胃熱	山查 麥芽 橘紅
	本草經疏	通草 白茯苓	竹茹 木瓜			便短赤或澀大便多			橘紅 神麴

金は人でいたとうから 大腸實四證 吞酸屬胃火 宜潤下 忌補斂 宜同嘈雜 忌同胃實 生地黄 諸樂俱見前 燥熱 麻仁 卷二 桃仁

尼下 熔熱	腸風下血屬大腸濕熱	郁李仁 石蜜	宜同大腸實加芒硝	忌同大腸實	便鞭閉	知母 枳殼	黄芩 槐花
神農本草經流			猪膽				大黄
兖			檳榔				石膏

金万正屋とって 臟毒屬血熱 忌同腸風下血 宜清熱涼血 黄芩 生地黄 浦黄 諸藥俱見前 紅麴 雞子 荆芥 槐花 兼升 甘寒 白芍藥 卷二 葛穀 防風 側柏葉 地榆 苦寒 白頭翁 甘草 黄連

大の日からんかり	甘草	白斂	大黄	宜下 苦寒	忌同腸風下血	腸癰屬大腸實火	浦黄	宜同腸風下血加忍冬
// 神農本草經疏	黄耆	連翹	白樂子	解毒	血	火		血加忍冬
經疏	生地黄	忍冬藤	白芷					麥門冬
卒九	明礬	天明精	白芨					倍加地榆

....

金なしたと言 膀胱實一證 宜潤 瞿麥 澤寫 知母 諸樂俱見前 淡渗 收澀 滑石 生蜜味作九 茯苓 車前子 猪苓 木通

Range 大子 ラー 神泉本草經疏 升 燥熱	二佳盛見三證	升麻 柴胡	宜同膀胱實佐以升提	諸藥俱見前	便	忌破氣 發散 燥熱	癃閉屬膀胱實熱
+經疏 七十						如屬水液不足兼思利小	

からいいたたる 喉痺即纏喉風屬少陽相火少陰君火並熾經曰 也 陽結為喉痺一陰者少陰君火也一陽者少陽相火 宜降 童便 玄參 蘇子 諸樂俱見前 清熱 調氣 山梔 麥門冬、 甘寒 知母 黄芩 苦寒 鹹寒 黄連 黄檗 陰

5 (0.10 tot 20 to 吐法 宜辛散 忌同三焦實 蘇子 黄檗 鼠黏子 急治用膽礬朴硝牛黄為末和勻吹入喉中又法 生犀角 佐以苦寒 知母 山豆根 麥門冬 山慈菇 神農本草經流 鹹寒 玄參 射干 苦桔梗 貝母 急則有鍼法 4+-甘草 童便 黄連 續隨子 吹法

金二、正是人 頭面赤熱屬上焦火升 宜降 忌同三焦實 蘇子 柿 玄參 用明礬三錢巴豆七粒去殼同礬煅礬枯去巴豆 即取礬為細末吹入喉中流出熱涎即寬 清熱 甘緩 蔗 枇杷葉 薄荷 卷二 佐以酸斂 童便 栝樓根 天門久、 棃 白芍薬 麥門冬

火いり車とう 多患此大人亦時有之 赤白遊風屬血熱熱則生風故善遊走俗名火丹小兒 鹹寒 宜清熱 忌同三焦實 牡丹皮 生地黄 五味子 涼血 浦黄 黄連 兼行血 神農本草經疏 辛寒 紅藍花 黄檗 甘寒 キニ 連翹 生甘草 苦寒

金りこり 真中風猝僵仆口噤不言不省人事如遺尿直視口開 風 手撒汗出如珠屬不治證西北高寒之地有此東南無 玄參 苧根 諸暴强直支痛經戾裏急的縮皆屬於風 宜兼外治砭出熱血及用漆姑草慎火草搗爛敷 六淫門 之即易愈 童便 鼠黏子 卷二 牛膝 赤芍樂 藍汁

RUTURE CYCLE OF IN	牛黄	芎 藭	羌活	桂枝	宜辛甘發散	諸樂俱見前	忌破氣 下	之
	辛夷	細辛	天麻	附子		前	吐	:
神農本草經硫	R	T	Mac	J	峻補真氣		苦寒	
座旗	牡荆實	崇本	麻黄	甘草			酸斂	
*+111	白芷	曼荆實	防風	獨活				

金いせんとって 類中風口眼歪斜語言蹇澀半身不遂口噤不言四肢 不舉痰涎壅盛昏眊不省人事 忌汗 勿犯之犯之則輕必重重必斃 切治風濕辛燥發散 麝香 南星 人参 吐 黄耆 蘇合香 半夏 大忌破氣 卷二 并開竅走真氣行血諸樂慎 薑汁 檀香 有痰加竹瀝 温執 苦寒 龍腦香 及

宜滋補 則氣血雙補 蘇子 前藥中加胡麻仁 霞天膏 枇杷紫 天門冬期胃薄弱 安息香以上開竅餘忌樂俱見前 陽虚者補氣 黎汁 甘草 兼宜清熱降氣豁痰及保脾胃 栝樓根 本卓聖庙 陰虚者補血 黄檗 竹瀝 石斛 貝母 麥門冬 童便 橘紅 荆瀝 14 T 陰陽兩虚 牛膝 次盆血於

							::N##:	
虚加人象	茯神 如	括樓仁	鼈甲	柏子仁	丹參	何首烏	'`	金定正匠生書
清 者有肺熱	便閉加肉於	沙参	木瓜	車前子	山茱萸	著預	五	X
虚加人參黃者有肺熱者勿入人參	如便閉加肉從蓉當歸倍麻仁	巴戟天	丰月苦同	竹葉	白蒺藜	莵絲子	甘菊花	4
2	你仁 如兼氣	茯苓	遠志	羚羊角	酸棗仁	白芍藥	枸杞子	

7 计草	芎藭	宜發散 辛甘	諸樂俱見前	忌補氣	欬嗽	塞兼流清游	感冒風寒公
荆芥	細辛	辛甘 温	見前	酸斂 閉氣		小心惡風寒或	名傷風其證
本等理版白芷	崇 本					聲重或聲啞	或頭疼身熱
前胡	防風					塞兼流清涕必惡風寒或聲重或聲啞甚者痰壅氣喘	感冒風寒俗名傷風其證或頭疼身熱輕者則否鼻必

金人口匠人一 傷風熱 宜辛寒 忌同感冒風寒 桑白皮 葛根 杏仁 石膏 麥門冬 甘寒 桔梗 前胡 桑白皮 久而不愈者屬虚陽虚者 知母 石膏 發散 桔梗 甘草 紫蘇 薄荷 薄荷 竹葉

寒 禁固皆屬於寒 大のしのいっていたの 滿急痛下利清白食已不饑吐利腥穢屈伸不便厥逆 凡中寒必本於陽虚 忌破氣 藥 諸藥俱見前 諸病上下所出水液澄澈清冷癥瘕癩疝堅痞腹 加人參黃者陰虚者加五味子地黃倍門冬白芍 苦寒 ド 神農本草經疏 甘寒 辛寒 玄

金りせんとうし 傷寒冬月即病宜從仲景法 生之大病而樂不從時顧不殆哉仲景醫門之聖也其 夫傷寒者大病也時者聖人所不能違者也以關乎死 宜補氣 溫補 桂枝 附子 傷寒古今時地不同因之六經治法宜罪 散寒 黄耆 乾薑 辛甘 温熱 麻黄 輕者解表 人参 重者

ころこりゅう シューニラ 益以從時地俾後之醫師知所適從庶幾患斯疾者可 時也如是則法不終窮矣故作斯議條列其方稍為損 物脆矣况在荆揚交廣深盆之地與北土全別故其樂 去古未遠風景猶厚形多壯偉氣尚敦應其樂大都為 立法造論後之明師如華佗孫思邈輩莫不宗之漢末 師也其法不可改也循至今時千有餘年風氣澆矣人 則有時而可改非違仲景也實師其意變而通之以從 北方感寒即病而設况南北地殊厚薄不侔故其意可 神農本草經疏 キャセ

金月口戶行 發熱不發熱而頭疼頭雖疼而有時暫止口雖乾而舌 内乾出於外多兼煩躁不煩躁者即輕證也不頭疼而 免於夭枉爾 若此者皆非傷寒也 得寐遇食不好亦不惡居處雖若虺怯而神氣安靜見 本不燥骨雖疼而頭不疼雖渴而不欲引飲至夜或偶 凡外感必頭疼其疼也不問晝夜探其苦本必從喉龍 辨驗外感真偽法

二陽治法總要

太陽病其證發熱惡寒惡風頭痛項强腰脊强遍身骨 痛脈雖浮洪而不數多不傳經煩躁脈數急者是欲傳

前胡二錢甘草八分葛根二錢生薑三片東二枚杏仁 失研懶水煎服秋深冬月應用此方亦可量加紫蘇 經宜先發汗以解表邪其樂以羌活湯為主羌活三錢

葱白如冬月天氣嚴寒感邪即病服此樂不得汗本方

神農本草經旅

イナへ

如病

金好正屋全書 冬大劑與之得汗即解 疼不得卧即係太陽陽明證羌活湯中加石膏知母麥 陽明也若外證頭疼遍身骨疼不解或帶口渴鼻乾目 枝八分芍藥二錢甘草一錢大棗二枚生薑一片 病太陽證惡寒畏風頭疼遍身骨疼自汗不渴宜用桂 不解者羌活一錢桂枝七分石膏一頭麥冬六錢知母 人自覺煩躁喜就清凉不喜就熱兼口渴是即欲傳入 三錢竹葉一百二白芍藥二錢甘草八分 如自汗煩躁頭疼遍身骨疼 如冬月即

Carrie Jine 熱甚則譫語狂亂循衣摸牀脈洪大而長宜急解其表 陽病不解熱結膀胱其人如狂血自下下之愈其外證 用竹葉石膏湯大劑與之不嘔無汗與葛根湯亦須大 自汗潮熱口渴咽乾鼻乾嘔或乾嘔目眴眴不得眠畏 正陽陽明病正陽陽明者胃家實熱是也其證不大便 之桃仁承氣湯無蓄血證大承氣湯 不解者不可下當先解表表證罷少腹急結者乃可下 人聲畏木聲畏火不惡寒反惡熱或先惡寒不久旋發 神中 本草理疏 され

氣湯下之下後按其腹中不作痛而和病即已解如作 **黄急用栀子麥冬淡豆豉大劑濃煎與之如已見身黃** 數數與之 陽明病無汗小便不利心中懊憹者當發 痛是燥糞未盡也再用前藥下之以腹中利二便通利 劑若表證已罷脈緩小便利是病解矣 若表證罷後 病頭眩欬而咽痛者用葛根甘草桔梗麥冬四味濃煎 邪結於裏大便閉小便短赤宜用調胃承氣湯或小承 陽明病不能食若其人本虚勿輕議下 陽明

金定匹尼全書

卷二

小承氣湯不行換大承氣湯勿大其劑若大便不鞕者 足濈然汗出者此大便已鞕也六七日以來宜下之用 飲童便 陽明病心下硬滿者此邪未入於腹中慎勿 用荆芥二錢葛根三錢麥門冬五錢牡丹皮一錢浦黃 急加茵陳為君主之 陽明病衂血此緣失於發汗宜 下之用竹葉石膏湯加栝樓一箇桔梗二錢黃連一錢 二錢茅根二兩側柏葉二錢生地黃三錢濃煎與之兼 陽明病邪結於裏汗出身重短氣腹滿而喘潮熱手

人とうう ときら

神農本草經疏

金りにたと言 寒六七日目中不了了睛不和無表證大便難宜承氣 熱大便溏胸滿不去者與小柴胡湯去人參加栝樓黃 慎勿輕下 雖硬不可攻之須俟其自大便或用蜜導膽導法通之 懊憹不能食但頭汗出梔子豉湯主之 湯下之 大下後六七日不大便煩不解腹滿痛本有宿食宜 陽明病自汗出或發汗後小便利津液內竭大便 陽明病下之早外有熱手足溫不結胸心中 陽明病發汗不解腹滿急者亟下之 陽明病發潮 傷

大三日子 Arab 氣湯主之服樂後腹中轉氣者更與一服若不轉氣者 婦大便必鞭鞭則譫語以小承氣湯下之若一服譫語 東三枚水煎日三服 止者勿再服 也吳茱萸湯主之吳茱萸二錢人參三錢生薑五分大 片蘆根三两内無熱證者小便利口不渴此為陽明虚 煩熱者竹如湯主之竹如三錢麥門冬五錢枇杷葉之 再用承氣湯下之 食穀欲嘔屬陽明非少陽也胸中 陽明病譜語發潮熱脈滑而數者小承 神農本草經疏 凡陽明病多汗津液外出胃中 4

そりら 若下之則胃中空虚客氣動膈心中懊憹舌上有胎者 室汗止在頭用荆芥三錢葛根三錢黄芩五致麥冬五 栀子豉湯主之 為難治勿復議下 明病脈浮緊咽燥口苦腹滿而喘發熱汗出惡熱身重 錢牡丹皮 五 般生浦黄 二 錢濃煎以童便對飲之 勿更與之若服樂後次日不大便脈反微澀者裏虚也 **岩脈浮發熱口渴小便不利者猪苓湯主之** たいった 若渴欲飲水舌燥者白虎湯加人參 陽明病下血譜語者此為熱入血 陽

大黄八兩厚朴三兩杏仁六兩蜜丸如梧子大每用十 汗譜語脈短者死脈和者不死 若吐若下後不解不 直視譜語喘滿者死下利者亦死 發汗多岩重發其 九日三服 陽明實則語語虚則鄭聲鄭聲者重語也 脾為約麻子仁九主之麻仁兩三 藥四兩枳實四兩 之附子乾薑甘草 跌陽脈浮而澀小便數大便鞕其 湯調服之 陽明病協熱下利者宜六一散心下痞者以黃連栝樓 脈浮遲表熱裏寒下利清穀者四逆湯主

欠いり事とうう

, W

神農本草經疏

个二

青一两甘草七銭 者大承氣湯下之利勿再服 喘直視脈弦者生澀者死澀者陽發微者但發熟譫語 散以黃連煎湯調服之 太陽陽明并病六七日表證 大劑白虎湯灌之石膏四兩麥冬二兩知母五錢加大 登高而歌此陽明實也以承氣湯亟下之如便不結者 如見鬼狀若劇者發則不識人循衣妄撮惕而不安微 大便五六日或至十餘日日晡時發潮熱不惡寒獨語 太陽陽明病協熱下利者宜六一 陽明病發狂棄衣而走

金りて

或痛耳聾脈法弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發 陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱未經吐下脈沈 寒三日少陽脈小者欲已也 汗發汗則譫語胃和者當自愈不和者則煩而悸 少陽病 罷潮熱汗出大便難譫語者宜大承氣湯 下其血乃愈當用桃仁承氣湯 又二陽并病太陽證 仍在其人發狂者以熱在下焦少腹當硬滿小便自利 其證口苦咽乾目眩往來寒熱胸脇痛胸滿 神農本草經疏 凡太陽病不解傳入少 主 傷

いってりまったい

金けてたとい 緊者與小柴胡湯柴胡二錢人參九分黄本九分甘草 加減法 若放者去人參大東加五味子一錢少佐以乾薑 渴外有微熱者去人參加桂 一 題 是跟版汗愈 夏加人参栝樓根 若腹中痛者去黄芩加芍藥三錢 枚 九分半夏五發生薑九分大棗二枚水煎溫服日三 若心下悸小便不利者去黄苓加茯苓二錢 若心下痞鞕去大棗加牡蠣二錢 若胸中煩而不嘔去半夏人參加栝樓實 若渴者去半 若不 陽

人とりうしてう 也 母二錢竹葉五十栝樓根二錢鼈甲二錢白芍樂二錢 目合則汗樂用百合一兩麥門冬五銭炙甘草一銭知 犯何逆以法治之,三陽合病脈大上關上但欲睡眠 明少陽并病必下利脈滑而數有宿食也當承氣湯下 傷寒六七日無大熱其人煩躁者此為陽去入陰故 三陽合病腹滿身重譫語遺尿白虎湯加百合主之 傷寒三日三陽為盡三陰當受邪其人反能食而 岩吐下發汗溫針譫語柴胡湯證罷此為壞病知 神農本草經疏 シナン

金りでたくこう 不嘔此為三陰不受邪也 三陰治法總要

熱傳入於裏雖云陰分病屬於熱糞結宜下腹滿不可 炙甘草以和之如便膿血即加滑石黃連佐以升麻乾 按宜下有燥糞協熱下利宜下腹痛下利宜芍藥黄芩 三陰病其證有二一者病發於三陽不時解表以致邪

葛

竹葉石膏湯不渴或心下痞者宜黄連黄芩芍藥枳

如邪雖入裏粪猶未結宜清其熱渴者用白虎湯

麥冬·栝樓輩以清之 或邪未結於下焦少腹不堅痛 熱寒邪直中陰經此必元氣素虚之人或在極北高寒 大いりるとうます 一颗 附以防其毒 桂大劑與之陽回寒退即以平補之劑調之勿過用桂 之地始有是證法宜溫補以接其陽附子人參乾薑官 升麻葛根柴胡之類 若從無陽邪表證從不頭痛發 白术炙甘草大棗乾薑芍樂大劑與之不止佐以升提 而誤用芒硝以伐真陰洞泄不已元氣將脫宜用人參 神農本草經疏 八十五

常也藥用辛溫佐以辛寒以解表邪太陽宜羌活湯陽 三陰各經見證悉從仲景傷寒論法治之如少陰咽痛 明宜白虎湯無汗不嘔者間用葛根湯少陽往來寒熱 冬傷於寒至春變為溫病大都頭疼發熱或渴或不渴 非令人可及也 咽中生瘡聲不出用苦酒湯到咽即效故知古人立法 三陽證俱然亦間有先微寒後即發熱者大抵發熱其 春溫夏熱病大法

金りとたる言

至夏變為熱病其表證大約與春溫同但熱比於溫則 等證不可汗吐下宜和解小柴胡湯渴者去半夏加枯 大劑與之二證若大便秘宜按之其邪已結於內便鞕 樓根耳聾熱盛去人參加麥冬知母栝樓根渴亦加之 石膏湯加玄參栀子桔梗鼠黏子連翹大青小青青魚 加羌活有少陽證則加柴胡黃苓如發斑白虎湯竹葉 邪氣更烈耳解表用白虎湯竹葉石膏湯有太陽證則

欠いりるこう

宜察邪結中焦小承氣湯調胃承氣湯下之邪結下焦

神農本草經疏

尖

金りせたと 傷寒溫疫其不可治及難治者皆屬下元虚 少腹堅痛始用大承氣湯下之

表裏同開竅於口凡邪氣之入必從口鼻故兼陽明證 大腸與肺為表東同開竅於鼻足陽明經屬胃與脾為 傷寒溫疫三陽證中往往多帶陽明者以手陽明經屬

那在三陽法宜速逐運則胃爛發斑或傳入於裏則屬 三陰邪熱熾者令陰水枯竭於法不治矣此治之後時

者獨多

大病差後勞復者枳實梔子湯主之枳實三枚梔子十 視襠燒灰 方寸匕日三小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子 者燒視散主之取婦人中視近陰處剪燒灰以水和服 陰中拘攣熱上衝智頭重不欲舉眼中生花膝脛拘急 傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或引 之過也 四枚鼓一升綿裹以清漿水七升空煮取四升內枳實

尺のりるときう

神農本草經疏

个七

食不美亦不惡如寒無寒如熱無熱口苦小便亦百合 微似汗若有宿食者加大黄如博棋子大五六枚 栀子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令 吐後者百合雞子湯 百合病者百脈一宗悉致其病也其證神思常黙然飲 之脈沈實者以下解之 後寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗解 地黄湯主之汗後者百合知母湯下後者滑石代赭湯

虚之人未有不因之而斃者矣戒之哉汗下之樂馬可 往往妄投汗下之藥以致虚人元氣變證叢生元氣本 近代醫師鹵莽既不明傷寒治法又不識雜證類傷寒

嘗試也

時氣傷寒 除陰證不可服

苦參 一兩水酒各一碗煎八分重者水醋各半服之一

人口口言 人子自 暑

汗而愈不論傷寒久近立效本草云天行尤良

諸病喘嘔暴注下迫霍亂轉筋身熱瞀鬱小便濁 神農本草經疏

知母	黄連	苦寒	宜清暑光些彩	諸樂俱見前	發散 閉氣	忌破氣 升	赤皆屬於暑
甘草	香薷		健脾	削		復忌下	卷二
人參	葛根		甘寒 甘溫			下 濕潤 辛溫	
黄耆	石膏		辛寒 酸寒			温辛燥熱	

The state of the s

中暑猝昏暈急	熱多火者	其氣必虚	大約用清	白芍藥	白茯苓	白术
以童便灌入	忘人參术	者傷氣無無	暑允些乳湯禾	白梅	木瓜	白藊豆
即省	,	果以動故當	官需飲生脈	烏梅	麥門冬	神麴
		棚氣為本惟時	取凡病暑之人		五味子	橘皮
	心工具司各中暑猝昏暈急以重便灌入即省	中暑猝昏暈急以童便灌入即省熟多火者忌人參求	中暑猝昏暈急以童便灌入即省熟多火者忌人參求	中暑猝昏暈急以童便灌入即省 ,大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人 ,大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人	白芍藥 白梅 烏梅 上野野母童急以童便灌入即省 馬奔岳軍急以童便灌入即省 电影多火者忌人参术 电影多火者忌人参术	白芍藥 白梅 烏梅 大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人大約用清暑益氣湯香薷飲生脈散凡病暑之人中暑猝昏暈急以童便灌入即省 岛野冬 五味子

疰夏由於脾胃薄弱胃家有濕熱及留飲所致 霍亂見胃虚條內忌宜俱同 太陽病中喝 宜人参白虎湯有肺熱火病人不能服參者用竹葉 石膏湯脾胃作寫者水調六一散 忌同暑 共研如泥新汲水調灌立蹇兼治中暑霍亂如神 又方用絲瓜葉一片白鹽梅肉一枚并取核中

濕 てこうき こう 肉筋脈故其病筋骨疼痛腰重痛不可轉側身重四肢 如泥按之不起皆屬於濕經曰地之濕氣感則害人皮 宜益氣健脾 忌同前 澤瀉 諸痙强直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重附腫肉 白茯苓 人參 白ボ 兼服生麥散 酸寒 苦寒 淡渗 白編豆 中農本草經流 半夏 白芍薬 木瓜 九土 橘皮

金りでたとこ 不利濕在上病嘔吐頭重胸滿濕在中 瀉濕在下病足脛跗腫脚氣臁瘡久不愈 忌濕潤 宜散 渗泄 帰 木瓜 蝉解 葛根 諸藥俱見前 甘 薏苡仁 鹹 寒濕加半夏 石菖蒲 卷二 辛苦 ボ 茯苓 病腹脹中滿泄 佐以防風 石斛 五加皮

八の1日 八十二 脚氣由於濕熱 辛温 宜清熱 除濕 忌温燥 黄檗 車前子 風濕加獨活 諸樂俱見前 淡渗 濕熱 木通 石斛 補氣 利小便 神農本草經疏 復忌破氣 甘平 麥門冬 甚者加漢防已 濕熱加黃檗 酸寒 升 <u>ተ</u> 木瓜 岩寒

なしらんしん たって 燥 食 毛髮脆折津液不生血枯胃槁以致飲食不化噎膈吐 不舒舌强不能言二便閉澀口渴口乾舌苦皮膚皴揭 忌升散 諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥角弓反張筋攣急 木通 石菖浦 諸樂俱見前 破氣 薏苡仁 澤寫 辛燥 萆解 車前子 大熱 温 防己 茯苓

أم								
尺かしのいる たまの	蘆根汁	五味子	柏子仁	胡桃	酥	麥門冬	者宜兼清熱	宜潤
5	汁	子	仁			久	清熱	盆血
	童便	酸東仁	人參	甘菊花	人乳	當歸		辛
神農本草經疏	1史	水仁	/3~	花	JU	師		甘寒
組	黎汁	白芍藥	松實	麻仁	牛乳	地黄		酸寒
								鹹寒
九十二	韭汁	蔗漿	天門冬	胡麻	蜜	肉從蓉		
			*			容		有熱證

The second secon

金らせたという 火 嘔涌溢食不下目昧不明暴注瞤瘦暴病暴死皆屬於 酸氣逆上衝禁慄如喪神守哽嘔瘡瘍 忌補斂 宜降折 諸樂俱見前 諸熱發與暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭附腫疼 佐以薑汁 升發 鹹寒 閉氣 **岩寒** 辛寒 温熱 甘寒 痺耳鳴及聲

文三豆車/三方	尼同火	猝眩仆九竅流血多不治	虚者宜甘	天門冬	山梔	黄連	大黄
柳農本草經疏	5	血多不治	虚者宜甘寒鹹寒以滋水不宜用苦寒傷胃	麥門久	立參	黄檗	童便
始			水不宜用苦	生地黄	生甘草	連翹	芒硝
李子	•		寒傷胃	藍汁	知母	石膏	黄芩

Africana di Professioni di Programa di Pro

猝心痛 というしん つき 日暴赤腫痛甚見肝實係內忌宜俱同 二便忽閉以利小便為先 宜服山梔 忌同火 忌同火 鹽湯 黎 蘇子 白芍藥 生犀角汁 卷二 延胡索 生甘草

尼同火	頭面赤腫	海金沙	石寫	麥門冬	桃仁	大黄	宜降潤
神農本草經流			猪苓	黄芩	石膏	蘇子	苦寒 甘寒
草經疏			車前子	山栀	知母	生蜜	辛寒 利竅
<u>ተ</u> ተ			木通	滑石	天門冬	麻仁	

宜潤 生津液	忌同火	忽大渴思冰水	重弱	石膏	薄荷	甘菊花	宜清熱解毒
生津液 辛寒				知母	蟬蛻	鼠黏子	發散
甘寒 鹹寒				竹葉	大黄	連翹	發散 苦寒 辛寒
果				生甘草	立參	荆芥	甘寒 鹹寒

R.	7061		暴瘖		D				
たらしついっ からかい	宜降氣	忌同火	瘄	忌宜俱同火	口乾舌苦	蔗漿	竹葉	石膏	
(63	宜降氣 發音聲 苦 甘寒 辛涼			火	:	童便	括	知母	
神農本草經疏	岩					便	栝樓根	女	
草經疏	甘寒					涼水	五味子	玄參	
	辛凉					水	不子	3	
九十五	鹹寒					冰	黎汁	麥門冬	
		CIPE CONTRACTOR						L	

金万正屋と言 暴注 忌同火 宜利水 苦寒 酸寒 桑白皮 茯苓 麥門冬 百部 蘇子 童便 黄連 枇杷葉 甘草 竹瀝 黄芩 薄荷 黎汁 貝母 桔梗 立參 天門冬 白芍薬

童便	山梔	丹砂	宜清鎮	忌同火	躁擾狂越罵詈端駭	虚者加人參	生甘草
大便閉者か	滑石	牛黄	苦寒 辛寒		三端 駭	人多	葛根
大便閉者加大黃下之不行加芒硝	石膏	黄連	鹹寒			蓮肉	滑石
不行加芒硝	知母	黄芩				白編豆	木通

金万匹尼人 氣逆衝上 禁慄如喪神守 忌同火 忌同火 宜降氣 宜同踩擾狂越 蘇子 番降香 酸斂 枇杷葉 山茱萸 甘寒 苦寒 鹹寒 橘紅 白芍樂 麥門冬 五味子

九十七		神農本草經疏		S. Changian Antian
	石膏		知母	麥門冬、
甘菊花	生地黄	,)]_	黄檗	黄連
玄參	竹葉		生甘草	白芍藥
甘寒	酸寒 苦寒 辛寒	苦寒	酸寒	宜清熱和肝
				尼同火
				瞤爽沓瘈
	-			童渦
桑白皮	牛膝	屮	黄檗	石斛

金りでた人門 瘧經曰夏傷於暑秋必疾瘧其證大都多熱多寒或熱 雜證門

多寒少或寒多熱少或單熱不寒或單寒不熱或先寒

或煩躁不得眠或大便燥結或瀉利或連發或間發或 後熱或先熱後寒或有汗無汗或汗少汗多或自汗盜 汗或頭疼骨痛或大渴引飲口苦舌乾或嘔吐不思食

三日發或發於陽或發於陰要皆中氣不足脾胃虚弱

暑邪乗虚客之而作雖隨經隨證投樂解散必先清暑

でいう いいんいか 得瘳也 者固表無汗者解表泄利者升發兼利小便便燥者兼 虚者補血兩虚者氣血兼補非大補真氣大健脾胃不 有虚實法異攻補久而不解必屬於虚氣虚者補氣血 益陰潤燥病有陰陽藥分氣血證有緩急治因先後人 有老痰伏飲者兼豁痰逐飲感瘴癘者兼消瘴癘汗多 **益氣調理脾胃為主有食者兼消導奪食有風兼散風** 忌破氣 神農本草經疏

金りとたといる 宜清暑益氣 足六經所見證施治 法 瘧必由於中氣虚破氣則傷中氣邪不得解甚則 誤下則邪氣陷於內變為滯下或腹滿腫脹嘔惡 諸藥俱見前 中满不思食作泄惡寒口乾惟傷食宜消不同此 不思食凡屬破氣下泄藥切戒勿施 健脾開胃 先清暑熱多者宜服白虎湯 兼消痰 宜分臟腑手

次三百事在一言 加減 氣湯 煎以井水澄冷須露一宿五更時溫服蓋瘧乃暑 食消即止勿多服多服則損中氣其藥俱宜黃昏 者加人參到三錢 門冬三两二錢粳米至二大撮病人素虚或作勞 硬石膏自一兩知母二兩四錢竹葉自一百片麥 杯大渴者加括樓根三錢至 兼飲食停滯者加枳實青皮草果一二劑 神農本草經疏 有痰加廣橘紅三錢竹瀝 不渴者用清暑益

グシにく じゅん くっぱ 邪為病暑得露則散也 卷二

足太陽經屬膀胱其證令人腰痛頭痛頭重寒從背起

先寒後熱熇熇暍暍然熱止汗出難已或遍身骨痛小 便短赤 羌活一錢至廣陳皮銀五分黃本二錢前胡二錢 甘草於五猪苓一錢知母二錢 若口渴者即兼

陽明宜加石膏麥門冬倍知母渴而汗少或無汗 并加葛根 若涉深秋或入冬無汗宜多加薑皮

橘紅二錢白豆蔻五分白茯苓三錢山查三錢麥 赤者與六一散二三服 有濕者以猪苓茯苓代 滑石下午服理脾健胃藥 味子代之 若發於陰并加當歸 汗多者加黄耆與四桂枝分八汗止即去桂枝不 可多服 若病人素有熱者勿服桂枝以芍藥五 錢佐以薑皮等三露一宿發日五更溫服 因虚而無汗或汗少者加人參與五麥門冬四 小便短澁或 因虚

次で可事と言

神農本草經疏

5

劳妙三龍香一銭人参三銭白水二銭白芍樂三 多服多服則損中氣 胃家素有濕痰者其證不 草果路之傷數食者加炒來菔子食消即已不可 錢白編豆三錢 有肺火者去人参白术加麥門 兼用薑皮 渴寒多方可用半夏橘紅二术大劑與之嘔甚者 冬五錢石斛三錢鳥梅肉一枚 停食者必惡食 加山查傷肉食者加黃連紅麴傷穀食者加枳實

不得眠甚則煩躁畏火光人聲木聲 足陽明經屬胃其證發熱頭疼鼻乾渴欲引飲目詢詢 宜服大劑竹葉石膏湯無汗或汗少不唱者可加乾 术 葛銭三 甚汗多寒時指爪皆紫黯者加桂枝分八 五更温服 不解屬氣虚用人參兩許薑皮兩許煎成露一宿 痰多加貝母橘紅得汗即解 病人虚而作勞者加人參 下午服理脾健胃藥如前方加減亦 寒熱俱甚渴 汗多加白 久而

ころのしつ いってんいから

神農本草經疏

百二

金げてたどう 足少陽經屬膽其證往來寒熱口苦耳聾胸脇痛或嘔 宜服小柴胡湯 渴者去半夏加石膏麥門冬 家有熱者去人參加知母倍門冬 有痰不渴者 如之 本方加貝母三錢至术茯苓錢三薑皮二母錢至 茯苓烏梅以代之 則損人津液令人聲啞宜用竹茹橘皮麥門冬白 病人陰虚而有熱者雖嘔吐忌用半夏生薑誤投 肺

Chalant Lines 墜頭疼兼寒甚者則問用辛溫如薑皮桂枝以為 寒如石膏知母柴胡甘寒如葛根麥門冬竹葉粳 作勞者亦因於虚皆宜甘溫以人參黃者水為君 嚮導以扶其邪則病易退凡寒甚者病因於虚或 米苦寒如黄芩之屬為君乃可以散暑邪除熱渴 汗樂宜大劑急逐暑邪母使遲留則病易愈繼以 理脾開胃大補真氣蔑不瘳矣邪在三陽藥宜辛 以上三陽經瘧邪客之者其證多熱多渴亦易得 神農本草經疏

金りとだとう 狀如欲死或頭疼而渴 足厥陰經屬肝其證先寒後熱色蒼蒼然善太息甚者 宜先服三黄石膏湯加柴胡鼈甲橘皮以祛暑邪後 牛膝為君佐以薑桂如熱甚而渴者去薑桂加知 草豆蔻枳實橘皮山查之屬在陰分者則以當歸 者則補之以參术佐以消導如白豆蔻麥芽砂仁 母麥門冬竹葉牛膝鼈甲 佐以辛甘如桂枝薑及之屬脾胃虚弱飲食不消

とうのしの あいたいかの 中起善嘔嘔己乃衰然後發熱熱過汗出乃己熱甚者 足太陰經屬脾其證先寒後熱或寒多若脾瘧必寒從 愈 鼈甲鈺 用當歸兩許橘皮等四鼈甲與五牛膝两許柴胡 加括樓根錢四麥門冬錢六竹葉片百知母錢 五 二濃煎露一宿發日五更溫服 寒多或寒甚指爪青黯者加桂枝薑皮人多 如有肺火不可服參者紙照本方多服自 . 六 199 如脾胃薄弱或溏泄去當歸加人參 神農本草經疏 如熱甚而渴 百三 四

金りて屋と言 或渴否則不渴喜火 起 足少陰經屬腎其證寒熱俱甚腰痛脊强口渴寒從下 宜先服人參白虎湯加桂枝以祛暑邪後用鼈甲 小便短赤 宜服桂枝湯建中湯 濃煎露一宿五更溫服 錢牛膝 两許熟甚者加知母麥門冬 五錢 錢四 巷 病人虚者以人参量皮許 有痰者宜加术橘皮 三各 五四 两

いっていしりゅうへいから 瘧病多挾痰以故熱痰須用貝母為君自三錢至八 瘧病多挾風有風者必用何首烏為君白术橘皮為 橘皮為君多加生薑皮 錢竹瀝竹站栝樓根橘紅白茯苓稱是以佐之甚者 可加霞天膏如寒痰發瘧寒多不渴者用半夏白术 者加桂枝錢許 而唱者去桂枝薑皮加竹如三錢人參獨皮四錢 用牛膝桂枝者肝腎同一治故也 4 神農本草經疏 **嘔則兼加薑皮與四** 百

消之脾胃薄弱者加人參騙豆蓮內大劑與之以愈 **芍藥滑石紅麴甘草佐以葛根升麻柴胡以表裹分** 暑邪盛解散不早陷入於襄則變為滯下急投苓連 隨證以治之不煩多樂而自止也 為度滯下若愈瘧亦隨止即不止其熱必輕仍隨經 臣葛根薑皮羌活以佐之不頭痛者除羌活 凡勞瘧病人陰不足或作勞或房勞病發於陰或間 又暑熱濕之邪內伏百藥不效者用獨雄九立愈

金写正屋名言

くらし きょうこう 乃差 膝何首烏為君橘皮為佐發於夜而便燥者加當歸 脾胃弱者勿加佐以薑皮熱甚勿入大劑與之日三 熱多宜 Ð 牛膝 橘紅 附録諸瘧主治 一發或三日一發三日 知母 乾葛 貝母 神農本草經疏 一發為病深須以鼈甲 黄芩 滑石 石膏 柴胡 竹葉 至 麥門久

12. 27 mars 1.	F 107 121.1921	72 14 2 15 15 15			of the comments of		Section 1
按應有山嵐	本陽虚非	熱非鼈甲	凡瘧疾多	青皮	三稜	瘧母宜	羌活
19:車八三 神農本草經疏 1里按應有山嵐瘴氣停痰留飲而發者古方類用常山	本陽虚非人參白术黃者不能除	熱非鼈甲牛膝不能除也多寒而久不解者其人必	凡瘧疾多熱久不解者其人必本陰虚法當益陰除	人参	縮砂蜜	鼈甲	
飲而發者上	不能除	多寒而久不	八人必本陰去		桂	射干	人參
古方類用常		小解者其人	应法 當 猛 陰 		橘皮	牡蠣	蒼术
山山		_火_	除				

金りてたと言 滞下俗呼痢疾其證腹痛便膿血或赤或白或赤白相 大毒損人真氣犯之多致危殆慎之慎之 砒霜等吐之令人誤執其方見瘧輒用不知二藥有

雜或下純血或下紫黑血塊或如豆汁或如魚凍或如 屋漏水或下純黄積類多裏急後重數登園而不得便 小便短赤不利或發熱或口渴甚則嘔惡不思食此皆

刀手三勢勢三二指長日

暑濕之邪與飲食積滯膠固腸胃而作必先祛暑滲濕

安胃為主傷氣分則調氣益氣傷血分則和血補血挟

尺已日言人言 慎之 或濕熱上攻肢節腫脹拘攣痛不可忍難以救療慎之 黄朴硝及誤用巴豆牽牛以致洞泄腸開而斃又有妄 其證以噤口痢為最重胃氣一絕則不可治矣故曰安 投訶子栗殼亞芙蓉肉豆蔻收澀之劑以致便閉腹脹 穀則昌絕穀則亡俗治多籍口迎而奪之之說輕用大 瘀血則行血樂雖因證而設要皆以補養胃氣為急故 閉氣 收澀 神農本草經疏 燥 温熱 鹹寒 百 滑膩

金にとたた 宜清熱消積 黄連 烏梅 甘草 錢炙甘草一錢黄檗一錢升麻七分煎服 山查 諸樂俱見前 二銭升麻七分 廣橘紅 滑石 黄芩 開胃氣 如胃弱加人參與四蓮子如十橋 如腹痛以黄連四錢白芍藥 升 蓮肉 升麻 白芍樂 利小便 葛根 白稨豆 紅麴 如裏 紅

とここのほう たいい 凡滯下非元氣壯實多噉能食之人慎勿輕用大黃 麻七分佐之 久痢不止加肉豆蔻一錢人參三 梅山查紅麴 白多加异茱萸七分 惡心欲嘔 急同上藥加當歸二錢 枳殼五強木香汁七匙 錢砂仁五分白茯苓二錢 即噤口痢多用人參蓮肉藊豆白芍藥以緑色升 如小便赤澀短少或不利亦倍之 赤多倍鳥 神農本草經疏 如後重甚加檳榔五發 如口渴去木香倍滑石 百八

金けてたんか 復有毒痢一證或珍毒內陷下膿血各藥不效者加 乳香沒樂各世分炒砂仁一錢久之自愈血虚可加 升麻盆母草炙甘草滑石末足矣若惡露未盡兼用 凡産後滯下積滯雖多腹痛雖極不可用大黄等樂 忍冬藤為君地榆丹砂犀角汁次之 巴豆牽牛等下藥 行之致傷胃氣遂不可救但用人參白芍當歸紅麴 阿膠三錢

人いううれんいう 寫利俗呼泄寫因於濕 宜安胃補脾 忌濕潤 枳殼蓮肉畧用升麻未滿七月勿用滑石 凡胎前滯下宜用黄芩黄連白芍炙甘草橘紅赤 白术 諸樂俱見前 人多 破氣 ¥3: 升 車前子 白茯苓 下 神農本草經疏 利小便 苦寒 蓮肉 升麻 滑利 橘紅 百九 白藊豆

をなしたって 陳皮乾薑紫蘇主之 若由飲食停滯者兼消導小 暑濕為病則小水短赤或口渴倍用薑炒黃連為君 查麥芽 佐以乾葛升麻 藿香 倍芍薬 吳茱萸 白萊菔 神麴陳皮肉豆蔻 蓮肉 木瓜 虚熱者去白术加 虚寒者加肉豆蔻 由於感風寒者二术吳茱萸砂仁 乾葛 炙甘草 補骨脂 川黄連

らていり時人から 證方所不載分別一誤則藥不對證多致不救慎之慎 然其證必由濕熱傷脾及飲食停滯又有瘀血發黃 五疸方書所載五疸酒食大饑後過飽女勞失治而成 執 忌破氣 宜清熱 諸樂俱見前 有瘀血者兼忌酸寒 閉氣 利水 ē 除濕 下 神農本草經疏 鹹 養胃氣 滑利 滞膩 有停滯者宜消 百 潤 燥

金岁正屋人 積滯 黄芩 梔子 茵陳蒿 汁蟹 仙人對坐草 加紅麴橘紅穀麥蘖山查 紅麴紅花桃仁延胡索蒲黃五靈脂韭 入薑汁少許飲之縣草一名九里香 有瘀血者宜行血 紫草 滑石 黄連 卷二 良取 首宿酒酒 虚者加人參 白茯苓 車前子 栝樓根 瘀血加琥珀牡丹皮 愈非 秦尤 白鮮皮 連錢草 元氣壯 停滯者 名

Callatan Arthur 神農本草經疏	蘇子橘紅	宜降 潤 清熱 苦寒 辛寒	諸樂俱見前	忌燥 溫熱 補斂 升	由於熱	痰	實者服前樂瘀血不行可加熟大黃虚者勿用
桑白皮 演荷	天門冬 枇杷葉	子寒 佐以鹹寒					熟大黄虚者勿用

金りせたとう 忌補斂 由於風寒 宜降氣 辛散 膠固者加霞天膏并用猫兒刺 橘紅 貝母 百部 諸樂俱見前 濕潤 蘇子 栝樓根 蛤粉 酸 卷二 鹹 杏仁 竹瀝 栝樓仁 童便 天麻 桔梗

いんいうのしんかう 由於濕 宜健脾 忌潤 桑白皮 前胡 桑白皮 諸樂俱見前 人參 鹹 燥濕 辛散 酸 海荷 半夏 白茯苓 二术 滞膩 神農本草經疏 發濕 佐以淡滲 澤瀉 橘紅 白前 南星 草 半夏 葛根 生薑汁

飲如涎而薄者或如涎而稠者伏於胸中及脾胃間或 金少里屋人 諸氣氣有餘即是火 痛不可忍按之不得下或發寒熱嘔吐不能飲食 吐酸水苦水黄水緑水或伏而不吐上支心胸胃脘作 忌升 忌宜俱同脾虚證內停飲條 虚者宜降 諸樂俱見前 閉氣 補斂 酸斂 調 滞膩 温 酸 辛 甘

大いりまくいう 實者宜破散 加人参 蘆根汁 蘇子 枳殼 木香 白芍薬 白豆蔻 T 青皮 香燥 辛苦 辛寒 鬱金 甘蔗 枇杷葉 五味子 沈香 神農本草經疏 番降香 橘紅 香附 檳榔 甘草 因虚極而氣不得行者 <u></u> 烏藥 童便 沈水香 麥門久、 厚朴

Ralain ditan	土樓影奪之宜下	羌活	升麻	火鬱發之宜散	人參蘆	升麻	屬五臟者
柳農本草經疏	追下		葛根	且散		柴胡	木鬱達之宜升
學職 厚朴			柴胡			川芎	升 吐
大黄			防風			瓜蒂	

-ı

7

をエにんしまたたって 關格不得大小便為關是熱在丹田也吐逆水漿不得 以通二便此急證法難緩治縱有裹虚通後再補 投辛香通家下降之樂以治其上次用下泄苦寒之樂 下為格是寒反在胸中也是陰陽易位故上下俱病先 金鬱泄之宜降 烏蠡魚 澤瀉 橘紅 蘇子 木通 桑白皮 赤小豆 猪苓 車前子

欠いり事とう **歲俗呼呃逆久病沈痼而發者屬真氣虚多不治** 宜降下 思升 龍腦香 藿香 滑石 沈香 諸藥俱見前 補斂 辛寒、辛溫 閉氣 木通 次用大黄 蘇合香 白豆蔻 神農本草經疏 酸 黄檗 橘紅 車前子 丁香 豆豆 生薑 蘇子 牛膝 知母

	11/18/11	A CHARLES	The Bearing	Children (TO THE REAL PROPERTY.			AND SOME	
大三四車人子司	蘆根汁	蘇子	宜降氣	諸樂俱見前	忌升 補	氣逆衝上而發者	汗吐者官	宜下大小	
神農本草經疏	麥門冬	橘紅	甘寒 鹹寒	乳前		而發者	汗吐者宜辛寒解表白虎湯之類	宜下大小承氣之類便不鞕閉按之腹中和軟未經	I
經疏	童便	枇杷葉					心湯之類	鞭閉按之腹	
巨		竹站		7				中和軟未經	

金りいり 吐 尼心升 血咯血鼻蛔齒蛔耳蛔舌上出血 宜降氣 忌升提發散 因痰水停膈而發者 半夏 橘紅 諸樂俱見前 11111 潤 開痰 苦寒 甘寒 蘇子 旋覆花 下 辛散 卷二 破血 補氣 酸寒 生薑 貝母 閉氣 桑白皮 白豆蔻 破氣

10+4	疏	神農本草經疏	大小 ついっ Astalo	
犀角汁	白芍藥	鼈甲	五味子	
枸杞子	生地黄	阿膠	牛膝	
沙参	天門久	鬱金	降香	
枇杷葉	橘皮	麥門冬	蘇子	
			寒甘寒	
鹹寒酸	医 兼行血	熱 涼血盆陰	宜降氣 清熱	
		前	諸樂俱見前	
	共傷胃	復忌極苦寒傷胃	温熱 辛燥	

をいくせんとう 眠 蓄血俗名内傷或積勞或多怒或飽後行房或負重努 熱類外感而不頭疼不作渴天明少問至午復劇有汗 汗多劑頭而還自汗無氣以息目光短不思飲食不得 力或登高墜下或奔逐過急皆致蓄血其證多發熱其 二便自利小便或赤大便或泄 童便 梭灰 牡丹皮 青蒿 耥節 側柏葉 當歸 剪草 浦黃 茅根 白藥子

大いうう 人はあ 宜行血 脾和肝 忌破氣 鬱金 桃仁 番降香 諸樂俱見前 辛温 復忌補氣 V. 紅藍花 没樂 當歸尾 五靈脂 佐以鹹寒 神農本草經疏 苦寒 浦黄 蘇方木 穿山甲 延胡索 瘀血行後宜補血益 辛燥 塵蟲 桂有欠 更 乳香 紅麴

頭痛 金りでたんご 騏驎竭 黄 酸聚仁 甚者用大黄花蓝石瘀行則止勿過劑如元氣虚 麥門冬 脾胃素弱者慎勿輕用大黄如瘀血行後宜生地 山茱萸 韭汁 牛膝 川續斷 大東 龍眼肉 白膠 童便 白芍樂 桃梟 枸杞子 炙甘草 當歸身

灰空回車等	白芷 蔓荆子	薄荷 川芎	羌活 防風	宜辛溫發散	諸樂俱見前	忌補斂	挾風寒者
神農本草經疏	刊子 生薑	ラーニテ本	細辛				
15.	葱白	升麻	荆芥				

 $(\mathbf{p}_{i}) = (\mathbf{p}_{i}, \mathbf{p}_{i}) = (\mathbf{p}_{i}, \mathbf{p}_{i}, \mathbf{p}_{i}) = (\mathbf{p}_{i}, \mathbf{p}_{i}, \mathbf{p}$

くつつ べんつ	生地黄	宜補血益陰	諸藥俱見前	忌辛熱發散	陰虚者	前胡	蘇子	宜豁痰降氣
	甘菊花	甘寒	หว			竹瀝	橘紅	辛燥
神農本草經疏	花 當歸	酸寒				术	月母	
F	天門冬、		ı			天麻	半夏	

齒痛 金りせたとう 忌升 眉稜骨痛 忌宜俱同陰虛頭痛 宜清熱涼血 观冬、 麥門冬 諸樂俱見前 補斂 苦寒 燥熱 枸杞子 五味子 卷二 辛寒 辛溫 烏梅 黄檗 甘寒 鹹寒 白芍樂

大いのまという 上下齦屬胃與大腸火宜石膏 麥門冬 生地黄 竹葉 蘇子 黄檗 麥門冬 西瓜皮灰 黄芩 薄荷 甘草 玄參 知母 生地黄 生甘草 神農本草經疏 童便 黄連 黄連 青黛 石膏 赤芍薬 枇杷葉 重 蘇子 薄荷 黄芩 牡丹皮 細辛 赤芍藥 熟大黄

胃脘痛 金りしゃんなっこ 俱同 宜降 因火者 真牙浮動及黑爛屬腎虚有火已見腎虚條內忌宜 忌補斂 諸樂俱見前 苦寒 燥熱 甘寒 鹹寒 辛寒

1. 20.10 not 1.1.10	橘皮	宜辛溫發散	諸樂俱見前	忌破氣 洪	因寒者	玄參	麥門冬	蘇子
神農本草經疏	草豆蔻	散	允前	滞膩 苦寒		童獨	炙甘草	橘紅
子裡疏	益智子						石膏	黄連
Jest 2	丁香						知母	山梔

金安里屋人 忌升 因宿食者 宜消導 兼降氣 乾薑 縮砂蜜 桂 山查 諸樂俱見前 補斂 苦寒 橘皮 吳茱萸 白术 草果 藿香 厚朴 香附 白豆蔻 紅麴

アルション かか 宜辛溫苦溫以行血 忌補氣 因瘀血者 青皮 桃仁 因脾胃虚弱以致食停者消導藥中加人參 枳實 諸樂俱見前 酸斂 厚朴 延胡索 神農本草經疏 檳榔 紅麴 穀麥糵 百千二 縮砂蜜 紅花 草豆蔻

金岁日居人 宜潤 因血虚者按之則痛止 忌破氣 童溺 山查肉 番降香 諸樂俱見前 赤芍藥 補斂 復忌補氣 甘寒 鬱金 琥珀 牡丹皮 燥熱 甘溫 肉桂 韭菜 菴蔄子 辛溫 通草 牛膝 三稜

ROED ALAND	雷丸	錫灰	宜殺蟲 苦	諸樂俱見前	忌補 升	因蟲者	白芍藥	麥門冬
神農本草經疏	使君子	苦楝根	酸	前	發散 甘		生地黄	炙甘草
網疏	蕪美	檳榔					當歸	酸聚仁
ie Ha	薏苡仁根	鶴虱						石斛

ならなりたとうで 宜降氣 辛温 虚弱人忌破氣 因惱怒者 縮砂蜜 大黄 五靈脂 蘇子 諸藥俱見前 烏梅 木香 枇杷葉 壮實人忌補氣 卷二 橘紅 白豆蔻 總忌酸斂 延胡索 番降香 升

腹痛 尺ついりょう これから 因於寒 宜溫中 忌宜俱見痰飲證下 因痰飲者 忌苦寒 下利 白术 諸樂俱見前 辛散 厚朴 神農本草經疏 百主 吳朱哲

甘草	山梔仁	宜甘 苦寒	諸樂俱見前	忌辛熟 香燥	因於熱火在少腹則絞痛	橘皮	金以正是
桔梗	麥門冬		前	燥補斂	少腹則絞痛		炙甘草
黄芩	石斛						木香
黄連	白芍藥						縮砂蜜

for magness were re							Comment.
欠こうできたます 用無者	滑石	枳實	宜破散	諸樂俱見前	忌補氣 大熱	諸痛不可按屬實	滑石
神農本草經疏	逢我茂	青皮	疏利 苦寒	見前	大熱	按屬實	木通
經本	木通	檳榔					戎鹽
ter##	大黄有積	三稜					

G Complete State of the Complete State of th

Ļ

今年人でたける **痺拘攣而痛也因風寒濕三者合而成風氣勝者為行** 宜補氣血 忌破氣 諸痛可按屬虚 當歸 酸棗仁 人參 諸藥俱見前 破血 甘溫 黄耆 五味子 炙甘草 酸斂 發散 白芍樂 ニボ 著預 生地黄

Crupin distin 神農本	牛膝 木瓜	防風 羌活	甘菊花 草解	漆葉 續斷	宜辛散 行氣 燥濕	諸樂俱見前	忌下 收斂 酸寒 *	痺寒氣勝者為痛痺濕氣勝者為著痺
神農本草經疏	天麻	獨活	防已	黄耆	甘温 淡溪		苦寒 鹹寒	勝者為著痺
更来	茯苓	秦艽	白术	甘草				

ないしたった 痿屬濕熱經曰治痿獨取陽明 宜大補氣血 忌破氣 菜耳 狗脊 澤寫 諸樂俱見前 石斛 # 菖浦 細辛 清熱除濕 辛熱發散 原蠶沙 蔓荆實 甘寒 車前子 威靈仙 杜仲 松節 甘温 桑寄生 海風藤 松葉 白蘚皮 苦寒

AND CALLED	<i>्</i> र च			COLOR BEAT		XXXX	Tarangan
Rand And Man	交腸其病大小便易位而出或因大怒或因醉飽遂至	黄芩	澤寫	石斛	生地黄	人參	酸寒
循常道法當宣吐	便易位而出		車前子	意改仁	麥門冬	黄耆	
建筑 吐以開提其	或因大怒或		木通	黄檗	白芍藥	二术	
黑使闌門清	因醉飽遂至		黄連	茯苓	木瓜	炙甘草	

金罗正屋人 利得司秘别之職則愈矣 宜升清降濁 忌破氣 燥熱 澤寫 升麻 車前子 橘紅 諸樂俱見前 猪苓 柴胡 兼補氣 淡渗 人參 木通 蘇子 降香 滑石 茯苓

欠い可事へいす 思在尸疰飛尸客忤此係天地陰邪殺厲之氣乘虚中 厥目直視手握拳或過身骨節疼痛非常 八或遍身青黯或忽消瘦聲啞面色青黃不定或忽驚 宜辟惡氣 安神鎮心 忌破氣 琥珀 諸藥俱見前 復忌補氣 丹砂 沈水香 神農本草經疏 升 辛香發散 燥熱 龍腦香 蘇合香 酸斂 金石鎮墜 百九 乳香 天竺黄

不歸經所以多患亦白帶也白帶多是脾虚蓋肝氣鬱	赤白帶下婦人多憂思鬱怒損傷心脾肝火時發血走	婦人門	遠志	天靈蓋	犀角	真珠	安息香	からんですんこう
思赤白带也	多夏思想野奴			瀬 肝	金銀箔	雄黄	檀香	卷二
白带多足	心損傷心脾時			生地黄	虎骨	鬼臼	木香	
界虚蓋肝氣熱	近火時發血走			当浦	代赭石	龍齒	麝香	

Committee of the Commit

帶下如濃泔而臭穢特甚者濕熱甚也且多有濕痰下 子黄檗白带多屬氣虚補氣健脾治法之要領也 茯苓山藥黄檗養术麥門冬之類濃煎不時飲之再用 為祭血而下白滑之物矣皆由風木鬱於地中使然耳 則脾受傷脾傷則濕土之氣下陷是脾精不守不能輸 六味地黄丸中加牡蠣粉海螵蛸杜仲牛膝蜜丸光大 法當開提肝氣補助脾元宜以補中益氣湯加酸聚仁 如豆空心饑時吞下五六錢陰虚火熾加枸杞子五味

次の一口 ラナノテョ 神農本草經疏

7

墜者宜蒼术白术黄檗黄苓茯苓車前子為主佐以升 とうじんじん

提 帶下如雞子清者脾腎虚極也面色必不華足脛必浮

腰腿必酸宜五味子八味丸間用開解養心之劑如歸

脾湯之類陰虚有火宜八味九中加五味子菟絲子車

蓋言崩久氣血虚脱而白滑之物下不止耳此證雖有 前子黄檗叔和云崩中日久為白帶漏下多時骨水枯

氣血寒熱之分要歸總屬於虚

1. C. 10 int 2: 5 氣 東仁麥門冬 赤帶久不止則血虚宜膠艾四物湯加便煅牡蠣粉酸 赤淋多因於心火肝火時熾不已久而陰血漸虚中氣 則當本而標之可也 標急而元氣不甚憊者先救其標標急而元氣衰劇者 漸損遂下赤矣治宜養心為主無以和肝緩中凉血清 忌破氣 降 温熱 神農本草經疏 百千

金八正是人 宜補斂 蛇床子 艾 牛膝 白膠 生地黄 山茱萸 諸樂俱見前 清熱 枸杞子 黄檗 香附 白茯苓 人參 ニポ 辛甘 苦寒 續斷 車前子 五味子 補骨脂 白芍樂 佐以淡滲 杜仲 牡蠣 澤瀉 阿膠 麥門冬

大さしのうけんさら	牡丹皮	白芍藥	甘草	人參	宜補脾胃	諸樂俱見前	忌破氣	血枯經閉由
神農本草經疏	白膠	縮砂蜜	茯苓	蓮肉	甘溫 甘平	見前	破血 燥熱	血枯經閉由於脾胃薄弱氣血不生
經疏	阿膠	羌絲子	著預	酸棗仁			膩膈滑腸	血不生
[hart-1	艾 實	+ 膝	橘紅	白編豆			升發 苦寒	
							寒	

金只正是一 經行先期為血熱 苦寒 宜凉血清熱 忌升 補氣 香附 麥門冬 生地黄 餘忌藥俱見前 當歸 辛温 補肝腎 牡丹皮 卷二 燥熱 兼降氣 甘寒 烏藥 白芍薬 艾辛以温上 天門冬 酸寒

次已四事各書 經行後期為血虚 宜補肝腎 尼行血 熟地黄 枇杷葉 黄檗 諸樂俱見前 麥門冬 破氣 甘溫 著預 黄芩 蘇子 枸杞子 燥熱 神農本草經疏 酸温 苦寒 知母 鼈甲 杜仲 人參 百千二 青蒿 阿膠

月事過多屬心火盛脾氣弱 インドノレド たんこう 宜凉血 尼破氣 麥冬 奖 諸樂俱見前 白膠 山茱萸 斂攝 降 牛膝 五味子 生地湯泄 辛溫 杜仲 酸平 苦寒 甘寒 青蒿 當歸 續斷 枸杞子 阿膠 生甘草

ner .	***********								_
R 1. 10 101 1.110	香附	地榆	人参	宜補氣血	諸樂俱見前	忌破氣	崩中屬氣血兩虚有熱	牡丹皮	
神農 神農	續斷	ち樂	黃耆	兼清熱	見前	行血 降	內虚有熱	白芍藥	
神農本草型硫	甘草	白膠	生出	甘溫 井		温熱			
	早	135	生地黄	甘寒		辛燥		酸聚仁	
Ja-Hen	麥門冬	阿膠	熟地黄	酸斂		苦寒		五味子	

金りしたんだった 熱入血室類傷寒或經事適來忽住或届期不行忽發 大熱口渴或厥但不頭疼為異於傷寒耳 發 忌補氣 浦黄炒 木耳灰 諸樂俱見前 山茱萸 温燥 桑耳灰 杜仲 辛燥 卷二 收斂 側柏葉 五味子 下泄 大熱 艾葉 白茅根 升

種子內分男女氣虚血虚精 忌破氣 宜行血清熱 諸樂俱見前 牛膝 如便閉加大黄 白芍藥 生地黄 破血 黄芩 牡丹皮 甘寒 延胡索 燥 過用辛熱 鹹寒 用寒 浦黄 童溺 麥門冬 苦寒 荆芥穗 犀角 蘇木

宜調氣補血 陽起石熱治男 蓮顏子精滑 車前子鹹寒治 海狗腎 補骨脂 何首鳥苦温益 子精熟治 子精滑温平治 精辛 男子宜固精 、陰弱子 男 男 男 男 鹿茸 魚膠平治 沙苑蒺藜固精益 牛膝苦平治男子 巴戟天子精寒 覆盆子 子精滑 柏實特温治男 子精寒温鹹治男 滑男 子 男 血子

Calor Art 白薇温平 父葉辛温 白芍藥酸寒 蓮內胃弱精寒 麥門冬甘無男 黄檗苦寒治 白膠血兩虚精寒 山茱萸酸温治男 男 女 神農本草經疏 女 當歸辛溫 紫石英温女 熟地黄益血生 內從容 温酸鹹治男 天門冬女火熾 五味子精滑精寒 人多處脾胃薄弱 夏素 精女 男 女

-	-		-				-	-	-7.I:
	白梅	白芍薬	麥門冬	蘇子	宜順氣	諸樂俱見前	忠破氣	妊娠惡阻	金万日屋と
	白			惄	甘寒	見前	升散		
	烏梅	竹葉	蘆根	橘紅	酸寒		燥熱		卷二
		人參	竹茹	枇	,		苦寒		
:			如	枇杷葉			滑腸		
		縮砂蜜	木瓜	白茯苓			順膈		
		選							

欠字可事人二言 安胎 忌破氣 順氣總宜清熱 二月以前宜養脾胃四月以後宜壯腰腎補血益陰 茯苓 用 諸樂俱見前 月以後及胎前滯下者方可用枳殼氣虚者不 破血 麥門冬 升散 神農本草經疏 辛熱 著預 辛燥 百年 人參

をよりしたくい 難産 胎漏屬氣血虚有熱 忌宜俱同安胎條 縮砂蜜 ち樂 盆母草 黄芩 鯉魚 白膠 白术 枸杞子 **艾葉** 烏雌雞 葱白 阿膠 青蒿子 橘紅 杜仲 續斷 生地黄 炙甘草 桑寄生

77.00		(Ata	A-1	C. 100				
CAN TO HOT YELL	酒	石燕	雷歸	千里馬	人參	宜補氣血	諸藥俱見前	忌破氣
神農本草經疏	生雞子	弓好り	芳窮	白芷梢	柞樹枝	滑利 潤	見前	破血 收斂
經疏	免頭	麻油	益母草	牛膝	魚膠			
百千人	滑石	猪脂	百草霜	桂心	冬葵子			

金分口屋人 預防血暈一腹痛坐草時即用蘇木菊花心者一兩生 麝香

地黄 一兩降香末二錢水三盌煎一盌加童便半盌兒

氣弱者無氣力送子出產門須服人參此藥能兼治横 血量亦須此樂更以家實丹一九灌下神效 墮地即飲之永無惡血衝心之患房中常打醋炭萬! 凡婦人

生倒産世醫不知也 凡臨産交骨不開惟濃煮柞木 ולים מנינע ומיו מניוליו 産後諸病 分五釐麝香一分芒硝一錢五分研細以酒調服立下 飲熱童便以滋樂カ更妙 温 宜行血 忌破氣 葉下必發 諸藥俱見前 甘寒 升 次宜補血清熱 酸寒 一刺 汗 神農本草經疏 吐 胞衣不下用乳香没藥末各七 下 總宜補養肝脾腎 燥 苦寒 豆儿 大熱

金りせたとう 産後少腹痛按之痛甚有結塊名兒枕痛 忌酸斂 蘇木 青蒿 白膠 乳香 當歸牌胃弱益母草 桂天寒無火澤蘭 補氣 黑豆 麥門冬 杜仲 没樂 破氣 卷二 升 乾地黄 牛膝 桃仁有弱者禁 白芍樂 鹿角末 山茱萸 下 續斷 嫖 五味子 紅花 人參 用用

7.7.10 ion 2.thi0 宜行血活血散結 橘紅 澤蘭 痛極加乳香没藥とか天寒加柱暑月勿用肺 白膠 山查肉 延胡索 諸藥俱見前 當歸 童便 牛膝 紅藍花 盆母草 神農本草經疏 兼健脾 黑豆 桃仁 五靈脂 逢我茂 牡丹皮 浦黄 一百里 乾薑 縮砂蜜 生地黄 蘇
す
木

金はでたん 産後少腹痛按之即止者屬血虚 忌行血 宜補血 乾地黄 酸素仁 白膠 有火勿用 諸藥俱見前 補脾 破氣 阿膠 麥門久、 白芍藥 和肝 汗 吐 當歸 牛膝 炙甘草 下 燥 苦寒 續斷 大東 人参 大熱

	14841		草經疏	神農本草經疏	/ ////	大丘しついる かいこう
	橘皮	文楽	白芍藥	茯苓	41-	続豆
	蓮肉	預	著預	甘草	44	人參
			月	健脾開胃		宜溫中補氣
					臣前	諸樂俱見前
						寒
苦	破氣	生冷	發散	膩膈	滑腸	已心消道子
						産後泄瀉
				橘皮	乜	著賴
	10.00					

在上りと下 合言 産後發熱或自汗盜汗 實表 宜補血 大熱 忌苦寒 發散 車前子 諸樂俱見前 五味子 寒滑傷脾 凉血 補骨脂为熱火 內豆蔻 及者少用 補肝 升提 破氣 補心 熾 破血 生津液 縮砂蜜 藿香 下 兼斂攝

ノスコロラストから 産後頭痛由於血虚 忌發散 宜盆血 黄耆 青筒 麥門久 諸樂俱見前 乾地黄 破血 涼血 7 酸聚仁 鼈甲 人參排熟者 炙甘草 降 升提 神農本草經疏 甘溫 辛燥 澤蘭 牡丹皮 白芍薬 甘寒 大熱 佐以酸寒 童便 五味子 黑豆

金罗之戶八三 産後發渴由於血虚有熱 産後氣喘由於氣血兩虚 宜同産後發熱加蔗漿倍麥門冬五味子 忌同産後發熱 忌同産後發熱 蘇子 白芍樂 生地黄 童便 黑豆 甘菊花 烏梅 甘草 五味子 當歸 鼈甲 麥門冬

クロショ んこう 産後惡寒由於氣血兩虚 宜補氣血 忌同産後發熱 宜補氣血 麥門冬 栝樓根 人參 人參 温中 潤肺 黄耆 童便 蘇子 橘紅 神農本草經疏 甘温 下降 五味子 枇杷葉 炙甘草 佐以辛温 生地黄 1001: 乾地黄 竹茹 栝樓仁 天門冬

ないりとにたたっ 産後小便不利或短赤由於腎水真陰不足 甘寒 忌利小便 宜生津液 龍眼肉 諸樂俱見前 山茱萸 天門冬 酸寒 益陰 餘忌同産後發熱 當歸 麥門冬 白芍薬 卷二 補血 涼血 車前子 生地黄 炮乾薑 清熱 枸杞子 甘溫

12.10: 11.10 産後大便閉結由於血枯內熱 宜益血 忌補氣 當歸 五味子 生地黄 諸樂俱見前 五味子 涼血 行血 蔗漿 麻仁 青筒子 熟地黄 辛熱 潤燥 神農本草經疏 燥 滋肝腎 鼈甲 牡丹皮 人乳 天門久、 下 生津液 升 岩寒 12640 蜜 麥門冬 肉蓯蓉 竹葉

金少正是人 産後腹脈由於陰血虚脾陰虚 産後不得眠 宜補心 忌同産後大便閉結 忌破氣寬中 遠志 生地黄 沙参 降心火 酸東仁 麥門冬 蓮肉 升提發散 補肝 茯神 龍眼肉 消導 補脾陰 白芍薬 吐 兼清内熱 丹參 竹葉 下 甘

大三ワーハーラ 神農本草經疏 夏素	忌升提發散 濕潤 滞膩 苦寒 生冷 品	産後惡心欲嘔或吐由於胃虚	木瓜 蓮實 車前子 英實	石斛 橘皮 薯蕷 五味子	白芍藥 酸聚仁 人参 茯苓	宜益脾陰 補脾 和肝 酸寒 收斂 甘溫	諸藥俱見前	苦寒 鹹寒 大熱 溫燥 滞膩	1)
	燥熟		貝	子	*	温			

CALDINE ALL 痘瘡 血熱證 尼溫補 天靈蓋 猪胰 漏蘆 小兒門 人參 燥熱 雞冠血 木通 栝樓仁 狗四足 神農本草經疏 猪四足 土瓜根 五字五 鯪鯉甲 葵子 麥門冬

金りをたんべる 宜涼血 黄連 重溺 犀角 月母 木香 人齒 活血 麥門久 連翹 生地黄 官桂 蟬蜺 冰片與此餘忌藥俱見前 解毒 甘寒 苦寒 人中黄 金銀花 鼠黏子 牡丹皮 附子 紫草 白芍藥 玄參 丁香

the state of the s 痧癣此證多有嘔吐者勿治嘔吐但治痧毒則嘔自止 思汗 宜辛甘發散 乾葛 蓮肉 桂枝 諸藥俱見前 人參 吐 ド 補氣 木香 紅鉛 糯米 丁香 苦寒 神農本草經疏 温 酸寒 當歸閉者禁用不 黄耆 大東 瘡密者佐以解毒 忍冬藤 1000十七 甘草 龍眼肉

金はんではんとう 况嘔中便有發散之義 宜清熱透肌 忌破氣 葛根 甘草 諸樂俱見前 薄荷 石膏 溫補 V 辛寒 玄參 黄檗 竹葉 鼠黏子 酸斂 卷二 甘寒 燥熱 黄連 蟬蜺 麥門久 赤檀木腳栖知母 苦寒 辛温 滞膩 黄芩 連翹 栝樓根

ころこの一百八十二 宜辛散誤施溫補禍不旋踵辛散如荆芥西河柳乾葛 發散為主藥用辛寒甘寒苦寒以升發之惟忌酸收最 悶甚則躁亂咽痛唇焦神昏是其候也治法當以清凉 類多效嗽多連眼中如淚多泄瀉多痰多熱多渴多煩 也小兒居多大人亦時有之殆時氣瘟疫之類歟其證 痧癣者手太陰肺足陽明胃二經之火熱發而為病者 青黛 之以辛散 13 荆芥 神農本草經疏 月母 麻黄去節沫蜜酒炒 一至人 如冬月佐

甘寒如麥門冬生甘草蔗漿苦寒如黄芩黄連黄檗貝 惟應大劑竹葉石膏湯如西河柳兩許玄參薄荷各二 收斂之劑多喘喘者邪熱壅於肺故也慎勿用定喘樂 痧癣乃肺胃邪熱所致初發時必然嗽宜清熱透毒不 參麥門冬以清餘熱消痰壅則自愈慎勿用五味子等 得止嗽虧後放嗽但用貝母苦梗甘草薄荷栝樓根玄 母連翹隨證輕重制劑大小中病則已毋太過馬 石膏鼠黏子麻黄清凉如玄參竹葉栝樓根青黛薄荷

金以口尼人

錢如冬天寒甚痧毒鬱於內不得透出者加蜜酒炒麻 白芍藥白編豆便膿血則加滑石末必自愈 亦表裏分消之義也漸後泄寫及便膿血皆由熱邪内 甘草則寫自止療家不忌寫寫則陽明之邪熱得解是 黄一劑立止凡熱勢盛者即用白虎湯加西河柳忌用 陷故也大忌止澀惟宜升散仍用升麻甘草乾葛黃連 升麻服之必喘多泄瀉慎勿止瀉惟用黃連乾葛升麻

欠いするとう

郵後牙疳最危外用牡黄牛糞尖煅存性研極細加真

神農本草經疏

喜素

アングレア とうで · 妙後元氣不復脾胃薄弱者宜用白芍藥炙甘草為君 **黄連甘草生地黄水煎加生犀角汁二三十匙調服緩** 翹玄參甘草懷生地鼈虱胡麻黃連木通濃煎飲之良 痧後生瘡不已餘熱未盡故也宜用金銀花荆芥穗連 强慎勿輕用參求 蓮肉山樂白稿豆麥門冬青黛龍眼肉為臣多服必漸 則不可救藥 片腦一分研勻吹之內用連翹乾葛荆芥穗升麻玄參

教奏築 草果 山查 紅麴橘皮 縮砂蜜 枳實 厚朴	宜溫中 消導	諸樂俱見前	忌升 苦寒	嘔吐因傷乳食者	經之邪熱也解其邪熱則諸證自退矣	痧鄉不宜依證施治惟當治本本者手太陰足陽明二
--------------------------	--------	-------	-------	---------	-----------------	-----------------------

...

金けでたとう 忌破氣 因寒者 宜辛熱 因暑者 半夏 藿香 白术 諸縣俱見前 温中 升 苦寒 橘皮 生薑 人參 卷二 半夏 丁香 白豆蔻 人參

有蟲者	滑石	甘草	茯苓	黃連	宜清暑	諸樂俱	忌升 破
	1			£	補氣	見前	破氣
	不通	曰編豆	竹如	香薷	安胃		温熱
	澤瀉	麥門冬	石斛	人參	兼利小便		!
		白梅	橘皮	木瓜			
	有蟲者	木 通	木通 澤瀉	大通 澤瀉 大通 澤瀉	大通 澤瀉 本通 零門冬	林通 安胃 兼利小便	俱見前 情報 安胃 兼利小便 情報 安胃 兼利小便

•	泄瀉	則宜補氣	木香	楝根	白芍藥	宜酸斂 佐	諸樂俱見前	忌升 甘	AND WIFE ATTHE
		4.0	使君子	烏梅	五味子	佐以苦寒	前		卷二
			總之數唱	檳榔	木瓜				
			總之數嘔吐宜安胃久	榧子肉	黄連				

因濕者	肉豆蔻	白豆蔻	橘皮	宜和胃消食	因食者	諸樂俱見前	總忌破氣下
冲農本草經疏	縮砂蜜	白术	草果			101	滑利
早經流		山查	紅麴				滞膩
1440		白茯苓	穀麥櫱				

12/20/00

今心能	總之當林	前樂中加人參	因暑者	著旗	澤寫	二术	宜燥脾利	金けてたんか
	總之當補脾胃兼升兼利小便	人參		猪苓	車前子	橘皮	利水	卷二
	外利小便	蓮肉		升麻	石斛	木瓜		
		白編豆		葛根	黄連	茯苓		

人のうらいたまる 宜降 忌補斂 真珠 茯神 貝母 丹砂 白檀香 諸樂俱見前 清熱 升 犀角 竹瀝 琥珀 燥熱 全蝎 鎮墜 神農本草經疏 豁痰 釣藤鈎 牛黄 龍腦 金箔 和肝 百年 麝香 膽星 殭鑑 天竺黄

金りせんと 慢驚多因久吐寫大病後陰陽兩虚而成 執 宜補脾健胃 忌破氣 遠志 甘草 諸藥俱見前 人分 下 龍眼肉 黄耆 麥門冬 和肝益氣 升 卷二 苦寒 酸東仁 茯苓 茯神 甘溫 及治急端藥 酸平 石菖蒲 冬瓜仁 白芍礫 佐以辛

神麴	胡黄連	酒	宜除疳熱	諸藥俱見前	忌破氣 醉	疳積	橘紅
山查	川黄連		兼消導 苦寒 甘寒	兄前	酸斂 燥熟		
木香	肉豆蔻						
る。	穀麥葉		佐以辛寒辛				

THE PERSON NAMED IN COLUMN

MARKET STREET, STREET,

:

諸點 焦定正足人言 忌升 宜殺蟲 厚朴 槟榔 諸樂俱見前 白旗美 白芙蓉花 甘 酸寒 雷丸 使君子 五穀蟲 岩寒 卷二 佐以辛寒 瀘會 雷丸 使君子 青黛 白术 岩楝根

胎毒 C. 10 15 . A. A. . 忌補斂 宜凉血清熱 致热毒内攻 烏梅 錫灰 生地黄 諸樂俱見前 燥熱 玄參 黄連 解毒 鶴虱 辛温 神農本草經疏 兼發散於外 黄芩 盧會 牡丹皮 勿從外治以 牽牛 ち樂 黄檗 100

金いんにんとう 腐風 忌破氣 宜涼血 黄連 鼠黏子 麥門冬 外科 諸樂俱見前 酸斂 殺蟲 牛黄 貝母 忍冬藤 燥熱 祛風 卷二 苦寒 F 犀角 甘草 佐以辛寒 荆芥 連翹

こうこう いっこういう 癰疽先後發渴 忌升 青焦 鼈虱 白花蛇 稀簽 諸樂俱見前 天麻 破氣 辛溫 烏梢蛇 續斷 胡麻仁 漆葉 天門冬 神農本草經疏 燥熱 白芷 苦參 皂角刺 芜獨活 甘菊花 吐 下 百五大 荆芥 半枝蓮 何首鳥 生地黄

金万七月人三七 宜活血 没藥 鼠黏子 夏枯草 白芨 白藥子 生地黄 已清者加人參黃者麥門冬五味子 涼血 紅樂子 ち樂 連翹 黄縣 白斂 甘菊花 解毒散結 卷二 黃蠟 生菜豆 栝樓根 茜草 地榆 忍冬藤 明礬 乳香 貝母 半枝蓮 紫花地丁 白芷

潰瘍 尺日のうとう 腫瘍 癰疽毒氣攻心發譫語 宜補氣血 忌閉氣 宜以生菜豆粉丹砂乳香為丸服之 尼宜俱同癰疽先後發渴更忌當歸 諸樂俱見前 苦寒 甘 破氣 酸温 神農本草經疏 佐以解毒 又忌燥 夏

龍腦香	雄黄	散毒外傳	麥門冬	貝母	白芨	出歸	人参	タットリ
松脂	雌黄			著預	白斂	地黄	紅鉛	·卷二
地榆	粉錫			大棗	忍冬藤	ち樂	胎骨	
水銀粉	攀石			五味子	甘菊花	甘草	黃耆	

'truta	-	Liver	-					
犬のしついってんきかの	白芨	止痛排膿外傳	艾灸	梓葉	槲皮	石灰	檗木	鐵鏽
神農本草經疏	白斂	外傅		学根	葵根	鐵漿	青葙子	白芨
十經疏	大黄			紫草	柳華	苦參	楝實	白斂
百五大	乳香			馬鞭草	五加皮	当浦	簡如	漏蘆
		L			<u>. </u>	· · · · · · ·	L	

ACTION MATERIAL	T. ROSE							-
宋已到 A1.15 图	忌補斂 溫熱	疔瘡	紅粉霜	黄芩末	黄蠟	仙人杖燒油人參	長肉收口外傅	
一种农本草經疏	熱		胡粉	珠末	血竭	油人參	傅	•
+ 經 疏			芝麻油	象牙末	蛀竹屑	金華		-
547			猪蹄湯	鉛丹	枯礬末	白蠟		
	· · · · ·			<u></u>	L			J.

雄黄外上	龍腦	蟾酥	鼠黏子	金銀花	貝母	生甘草	宜涼血活血
	鐵鏽	紅藥子	攀石以上	蒼耳草	紫花地丁	辟虺雷	解毒 祛風
	桑磠	白芨	半枝蓮	連翹	白藥子	茜草	汗下
	銅青	白剱以外上	牛黄	夏枯草	大黄	生地黄	

9	貝母 天明精 没藥 薄荷	乳香 麝香 夏枯草 鼠黏子	連翹 玄參 忍冬藤 紫背天葵	佐以辛寒	宜清熱散結 和肝涼膽 苦寒 甘寒 鹹寒	諸樂俱見前	忌補氣 辛熱 酸斂	瘰癧馬刀同屬少陽膽經治法亦同	
---	--------------	---------------	----------------	------	---------------------	-------	-----------	----------------	--

瘦瘤	回热窩泥	攀石	海際	守宫煅	鼈甲	指本	老5日在台灣 肥皂炭
)	斑猫	海蛤	稍頭	括樓根	甘草	皂角子
		蟾酥	蘇合油	天荷葉	亞心會具	昆布	何首烏
		鼈虱胡麻	雄黄	映山紅	漏蘆	牡蠣	崇 胡

3					痔		
くこう"、こうま	宜補血	宜凉血	諸樂俱見前	忌破氣	寿有的外	文蛤	尼宜俱同瘰癧兼宜
	甘寒	活血	假見前	降			问瘰癧
五倍子	苦寒	除大腸熱		燥熱、		南星	兼宜
神農本草經疏 街連	酸寒			辛溫		通草	薛
連	1	兼升				草	辞荔
養女	佐以辛寒	去血過多者				生	半夏
Alternative participation of	of reason des	多者					

ARABAN TO THE RESERVE TO THE RESERVE

ine.	THE PERSON	1	Tank skape					MAJAHAMAT.
欠三日事人時	刺蝟皮	生地黄	地榆	槐實	長肉	宜凉血	諸藥俱見前	忌破氣
7	人 蛀竹屑	迎解赤	白芨	黄連	·	清利濕熱	見前	下發散
神最本草經疏	月 明礬	猪懸蹄	忍冬藤	黄芩		解毒消		温燥 辛熱
[B.4:0]	金頭蜈蚣	蹄 黄牛角鳃	藤 半枝蓮	主月ば無		消漏管 補氣血		熱
	蚂蚁	用舰	運			血		

;

-1110 Aug	CALLED THE	Cara		Company of		115122	
忌補氣 升	乳嚴乳癰內外吹	文給以生	血長肉以上補氣	麻皮灰	山藥	人參	をちて人 きぎ
温補辛	吹	洗 濃	天明精	鉛華	枯礬	白芍藥	黄耆
辛熟燥酸			地骨皮俱	月經布	黄蠟	五味子	熟地黃
一般			計者皮硝	没食子	白蠟	牛膝	雷歸
		44.7374					

人工日 : 10 人工 10	忍冬藤	乳香	青皮	黄連	山慈姑	貝母	宜散結氣	諸樂俱見前
1971	括樓仁	没藥	橘皮	甘草	山豆根	橘葉	和肝	光前
神農本草經疏	仁頭垢	漏蘆	壮鼠養	柴胡	化 浦公英	連翹	涼血活血	
()自办十二			,				清熱解毒	
٠٠	人爪	夏枯草	王不留行	白芷	紫花地丁	括樓根	岁	

蛇床子外	木瓜	黄檗	青黛	宜凉血活血	尼同乳巖	陰蝕即下部	金50屋台電
橄欖核外	牛膝	小薊	茜草	除熱散毒			半枝蓮
蛀竹屑外	木通	父禁	苦參	苦寒 辛寒			茜根
猪脊髓外	全蝎外	馬鞭草	鮮地骨皮	寒			

The state of the s

次三日臣在了一一种农本草题或 医药络线具儿前	酸寒	忌破氣 閉氣 升散 酸斂 苦寒 冷利	金瘡	天靈蓋外 滴乳石外 白蠟外	龍腦香外 白殭蠶外 粉霜外 煙膏	珠末外 皂角末外 鉛丹外 象牙	青葙子外 腻粉外 官粉外 杏仁
149		冷利 帰			煙膏外	象牙末外	杏仁外

造竹釋	古錢	水楊花	さる第	半夏	牛膝	地黄	宜止血和
韭	自然銅	釣樟根	乳香	茜草	甘草	产展出	和血凉血
大小薊外	狗頭骨	黄荆子炒	没藥	白膠	麥門冬	冶田郎	甘溫 甘寒
劉寄奴外	黄麻皮灰	黄荆子炒黑王不留行	艾葉	杜仲	地榆	續斷	佐以辛溫

at a minute of the second of t

一尺心の言人はあ 破傷風 跌撲傷損 忌同金瘡 宜同金瘡佐以祛風樂如白芷荆芥防風柴胡之屬 忌同金瘡 降香外 紫檀末外 花蓝石州 三七外 海螵蛸外 騏驎竭外 神農本草經疏 桑柴灰外 古石灰外 百江 白蠟外 人骨灰外

金りなりたとう 火灼 踒折挫閃 宜同金瘡有瘀血停滯者宜加行血藥如桃仁紅花 忌燥熱 忌宜俱同金瘡跌撲 蘇木自然銅廳蟲千年灰古文錢之屬 井泥 醋 物塗暴餘忌藥俱見前以上寒餘 及寒物塗罨 冰 卷二 涼水 芭蕉根

次定四事全書門	滿浸時時日	外用好酒	地榆	生胡麻	石膏	黄連	柴胡	宜拔散火毒
神農本草經流	あ之即不死	滿浸傷處溫	山梔	食鹽	黄檗	麥門冬	葛根	辛散 潤
新	一方用蜜水	即易之如漏		豆將四	雞子油	連翹	甘草	甘寒辛
ig.	滿浸時時易之即不死一方用蜜水潤之一方石	用好酒滿浸傷處溫即易之如遍體被傷用酒		黄芩	柏白皮	括樓根	升麻	辛寒 苦寒

Constitution of the second section of the second se

神農本草經疏卷二 黏米炒黑為末將菜汁調敷神效 灰水和生芝麻油敷治巳爛臭甚者神驗 漆姑草 柒英皮 韭菜炒熟 雞子白 杉材 井中苔萍 一方用